English

NATCORE™

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% w/w SC
(Fungicide)

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% w/w SC is a suspension concentrate fungicide for control of Fruit rot, Dieback and Powdery mildew in Chilli, Downy mildew, Powdery mildew in Grape, Sath (Venturia inaequalis), Powdery mildew (Podosphaera leucotricha), Premature leaf fall (Marssonina coronaria) in Apple, Purple blotch (Alternaria porri) in Onion, Sheath blight in Rice, Yellow rust (Puccinia striiformis) in Wheat, Early blight (Alternaria solani) in Tomato, Early blight (Alternaria solani), Late blight (Phytophthora infestans) in Potato crop. This formulation is equivalent to Azoxystrobin 12% + Tebuconazole 20% SC on w/w basis.

Recommendation:

Crops	Common Name of Diseases	Dosage per Hectare			Water Volume	Waiting Period before last spray (in days)	Re-entry Period
		AI (g)	Formulation Dilution in Water (ml)	Water (litres)			
Chilli	Fruit Rot, Powdery Mildew, Dieback	72 - 120	600 - 1000	500 - 750	5		
Vine	Downy Mildew, Powdery Mildew	72 - 120	600 - 1000	500 - 750	7		
Apple	Sath (Scab) (Venturia inaequalis)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	7		
Apple	Powdery Mildew (Podosphaera leucotricha)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	7		
Apple	Premature Leaf Fall (Marssonina coronaria)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	7		
Onion	Purple Blotch (Alternaria porri)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	7	24	
Rice	Sheath Blight (Rhizoctonia solani)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	7		
Wheat	Yellow Rust (Puccinia striiformis)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	7		
Tomato	Early Blight (Alternaria solani)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	7		
Potato	Early Blight (Alternaria solani) Late Blight (Phytophthora infestans)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	7		
Potato	Downy Mildew (Peronospora sparsa)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
Rice	Sath (Scab) (Ustilaginoidea virens)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
Sugar beet	Cercospora Leaf Spot (Cercospora beticola), Rust (Uromyces betae), Powdery Mildew (Erysiphe betae)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
Sugar beet	Root Rot (Rhizoctonia solani), Seedling Damping Off (Rhizoctonia solani), Seedling Damping Off (Pythium spp.)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
Sugar beet	Leaf Spot (Ramularia beticola), Leaf Spot (Phoma betae), Leaf Spot (Stemphylium botryosum)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
Sugar beet	Leaf Spot (Alternaria spp.), Leaf Spot (Cercospora beticola), Leaf Spot (Ramularia beticola), Leaf Spot (Phoma betae), Leaf Spot (Stemphylium botryosum), Rust (Uromyces betae), Powdery Mildew (Erysiphe betae), Root Rot (Rhizoctonia solani), Seedling Damping Off (Rhizoctonia solani), Seedling Damping Off (Pythium spp.)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		

Direction of Use: Take the measured quantity of fungicide and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water, stir well to form a spray solution.
Time of Application: To be applied preventively and to be repeated at 15 days interval depending upon prevailing weather conditions and disease pressure.
Precautions: 1. During spraying wear suitable respiratory equipment. 2. Wear suitable protective clothing and chemical resistant boots. 3. Wear suitable gloves. 4. Wear chemical goggles or face shield.
Symptoms of Poisoning: Irritating to eyes. May cause sensitization by skin contact.
First Aid: 1. Inhalation: Remove victim to fresh air. Keep victim warm and at rest. If breathing is difficult, give oxygen. Obtain medical attention. 2. Ingestion: Do not induce vomiting. Wash out mouth with plenty of water. Rinse mouth before giving glass of water. Never give anything by mouth to an unconscious person. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention. 3. Skin contact: Remove affected clothing and wash all exposed skin area with soap and water followed by warm water rinse. Consult a doctor in the event of any complaints. 4. Eye contact: Wash off with plenty of water. If pain persists, consult an ophthalmologist.
Phytotoxicity: Non phytotoxic when used as recommended.
Antidote: There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportive therapy.
Disposal of Used Container: 1. Empty containers should not be re-used. 2. Destroy the empty containers after use and bury them 15 meter deep in soil away from habitation. 3. Surplus spray material or washings from machinery and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
Storage Conditions: 1. Do not store consumer food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material. 2. Store the fungicide in its original pack tightly closed, away from the reach of children. Irresponsible persons and livestock in a secure room, away from the rooms used for storing foodstuffs, animal feeds and other articles under lock and key. 3. The rooms or premises meant for storing shall be well lit, dry, well-aerated and shaded but of sufficient dimension to avoid contamination with vapour. 4. Transport the fungicide in such a manner so as not to come in contact with foodstuffs and animal feed.
Composition of Formulation/Insecticide:

Component	w/w
Azoxystrobin a.i.	11.00%
Tebuconazole a.i.	18.30%
Magnesium aluminium silicate	0.92%
Polydecyl acetal dialyether	1.83%
Methyl methacrylate graft copolymer	2.75%
Sodium alkylnaphthalene sulfonate	
hemidethyl ammonium	0.92%
Dimethyldodecylamine	0.37%
1,2 Benzisothiazoline-3-one	0.09%
Propylene glycol	7.30%
Heteropolysaccharide 2% solution	0.028%
Water	0.5%
Total	**100.00%**

Caution: 1) Not to be used on crops other than specified on this Label/Leaflet.
2) The combination product is toxic to fish and aquatic organism therefore, not to be used near aquaculture.

Hindi

नैटकोर

एजोक्सीस्ट्रोबिन 11% + टेबुकोनाजोल 18.3% डब्ल्यू/ डब्ल्यू एस सी
(फफूंदनाशक)

एजोक्सीस्ट्रोबिन 11% + टेबुकोनाजोल 18.3% डब्ल्यू/ डब्ल्यू एस सी मिर्च में फल सड़न, शाकाणु धब्बा, चूर्णी फफूंदी, अंगूर में डाउनी फफूंदी, चूर्णी फफूंदी, सेब में चूर्णी फफूंदी (सेब) (वेंचुरिया इनैक्वेलिस), चूर्णी फफूंदी (पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रिचा), समय से पहले पत्ती गिरना (मार्सोनिना कोरोनारिया), प्याज में पर्पल धब्बा (अल्टरनेरिया पोरी), चावल में शीथ ब्लाइट (राइजोक्टोनिया सोलानी), गेहूं में पीला रतुआ (पुक्किनिया स्ट्रीफोर्मिस), टमाटर में अर्ली ब्लाइट (अल्टरनेरिया सोलानी), आलू की फसल में अर्ली ब्लाइट (अल्टरनेरिया सोलानी) व लेट ब्लाइट (फाइटोफ्थोरा इंफेस्टेंस) के नियंत्रण के लिए। यह फार्मूलेशन डब्ल्यू/डब्ल्यू आधार पर एजोक्सीस्ट्रोबिन 12% + टेबुकोनाजोल 20% एससी के समतुल्य है।

सिफारिश:

फसल	रोग का नाम	मात्रा/हेक्टेयर			पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव के बाद प्रतीक्षा अवधि (दिनों में)	पुनः प्रवेश अवधि
		सक्रिय तत्व (ग्राम)	फार्मूलेशन की मात्रा (मि.ली.)	पानी में घोल (लीटर)			
मिर्च	फल सड़न, चूर्णी फफूंदी, डाइबैक	72 - 120	600 - 1000	500 - 750	5		
अंगूर	डाउनी फफूंदी (प्लास्मोपारा विटीकोला)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
सेब	सेब का धब्बा (वेंचुरिया इनैक्वेलिस)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
सेब	चूर्णी फफूंदी (पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रिचा)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
सेब	समय से पहले पत्ती गिरना (मार्सोनिना कोरोनारिया)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7	24	
प्याज	पर्पल ब्लाइट (अल्टरनेरिया पोरी)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
चावल	शीथ ब्लाइट (राइजोक्टोनिया सोलानी)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
गेहूं	पीला रतुआ (पुक्किनिया स्ट्रीफोर्मिस)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
टमाटर	अर्ली ब्लाइट (अल्टरनेरिया सोलानी)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
आलू	अर्ली ब्लाइट (अल्टरनेरिया सोलानी) लेट ब्लाइट (फाइटोफ्थोरा इंफेस्टेंस)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
आलू	डाउनी फफूंदी (पेरोनोस्पोरा स्पार्सा)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	10		
चावल	खैरा (उस्टिलाजिनोइडिया विरेंस)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	10		
चुकंदर	सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा (सर्कोस्पोरा बेटिकोला), रतुआ (यूरोमाइसेस बेटाई), चूर्णी फफूंदी (एरिसिफे बेटाई)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
चुकंदर	जड़ सड़न (राइजोक्टोनिया सोलानी), पौध गलन (राइजोक्टोनिया सोलानी), पौध गलन (पिथियम स्पा.)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
चुकंदर	पत्ती धब्बा (रामुलेरिया बेटिकोला), पत्ती धब्बा (फोमा बेटाई), पत्ती धब्बा (स्टेम्फिलियम बोट्रियोसम)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
चुकंदर	पत्ती धब्बा (अल्टरनेरिया स्पा.), पत्ती धब्बा (सर्कोस्पोरा बेटिकोला), पत्ती धब्बा (रामुलेरिया बेटिकोला), पत्ती धब्बा (फोमा बेटाई), पत्ती धब्बा (स्टेम्फिलियम बोट्रियोसम), रतुआ (यूरोमाइसेस बेटाई), चूर्णी फफूंदी (एरिसिफे बेटाई), जड़ सड़न (राइजोक्टोनिया सोलानी), पौध गलन (राइजोक्टोनिया सोलानी), पौध गलन (पिथियम स्पा.)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		

उपयोग की विधि: मापी हुई फफूंदी की मात्रा में कुछ मात्रा में पानी मिलाएं। एक छड़ी या लोह से अच्छी तरह आपस में मिलाएं और फिर शेष पानी में मिलाकर घोल तैयार करें।
उपयोग का समय: मौसम की स्थिति और रोग के प्रकोप के आधार पर निवारक रूप से उपयुक्त अंतर 15 दिनों के अंतराल पर दोहराएं।
सावधानी: 1. छिड़काव के दौरान उपयुक्त श्वसन उपकरण पहनें। 2. उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़े और रासायनिक प्रतिरोधी जूते पहनें। 3. उपयुक्त दस्ताने पहनें। 4. केमिकल गॉगल्स या फेस शील्ड पहनें।
विषाक्तता के लक्षण: आंखों में चुभन। त्वचा संपर्क से संवेदनशीलता संभव।
प्राथमिक चिकित्सा: 1. साँस लेना: पीड़ित को ताजी हवा में लाएं। पीड़ित को गर्म और आराम से रखें। यदि सांस लेने में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन दें। चिकित्सा सहायता लें। 2. निगलना: मुंह को पानी से अच्छी तरह धोएं। पीड़ित को पानी पिलाकर उल्टी न कराएं। बेहोश व्यक्ति को कुछ खिलाएं-पिलाएं नहीं। यदि सांस लेने में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन दें। चिकित्सा सहायता लें। 3. त्वचा संपर्क: प्रभावित कपड़े हटाएं। प्रभावित त्वचा को साबुन और पानी से धोएं। गर्म पानी से धोकर पोंछ लें। किसी भी शिकायत की स्थिति में डॉक्टर से परामर्श लें। 4. आंख: यदि संपर्क हो तो आंख को पानी से धोएं। यदि दर्द बना रहे तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें।
फाइटोटॉक्सिसिटी: सुझाई गई मात्रा में इस्तेमाल किए जाने पर गैर-फाइटोटॉक्सिक।
प्रतिविष: विशेष प्रतिविष नहीं। लक्षणानुसार उपचार करें और सहायक चिकित्सा दें।
उपयोग किए गए कंटेनर का निपटान: 1. खाली कंटेनरों का पुनः उपयोग नहीं करना चाहिए। 2. खाली डब्बे का बाद में उपयोग करने के लिए आवास से दूर जमीन में 15 मीटर गहरे गड़ा दें। 3. बचे हुए स्प्रेयरी या मशीनों और कंटेनरों की धोवन का निपटान सुरक्षित तरीके से करना चाहिए ताकि पर्यावरण और पानी का प्रदूषण न हो।
भंडारण की स्थितियां: 1. जहां उपभोक्ता खाद्य, पेय पदार्थ या तंबाकू के संदर्भ में इस पदार्थ से दूषित हो सकते हैं, वहां खाद्य पदार्थ, पशु चारा और अन्य वस्तुओं के भंडारण के कमरों से दूर, ताला लगे कमरे में बच्चों की पहुंच से दूर अपने मूल पैकेट में कसकर बंद फफूंदीनाशक को भंडारित करें। 2. भंडारण के लिए बने कमरे या परिसर अच्छी रोशनी वाले, सूखे, हवादार, अच्छे तरह से छायादार लेकिन पर्याप्त आकार के ताकि वाष्प से संदूषण से बचने के लिए पर्याप्त आकार का होना चाहिए। 4. फफूंदीनाशक को खाद्य पदार्थ और पशु आहार के संपर्क में आने से बचाने के लिए इस तरह से ले जाएं।
फार्मूलेशन / कीटनाशक की संरचना:

घटक	w/w
एजोक्सीस्ट्रोबिन a.i.	11.00%
टेबुकोनाजोल a.i.	18.30%
मैग्नेशियम एलुमिनियम सिलिकेट	0.92%
पॉलीडेसिल एसिटाल डाइएथर	1.83%
मेथिल मेथाक्रिलेट ग्राफ्ट कॉपोलिमर	2.75%
सोडियम एल्किलनैफ्थलीन सल्फोनेट	
हेमिडेथिल अमोनियम	0.92%
डाइमेथिलडोडेसिलामाइन	0.37%
1,2 बेंजिसोथियाजोलिन-3-वन	0.09%
प्रोपिलीन ग्लाइकोल	7.30%
हेटेरोपॉलीसैकराइड 2% सॉल्यूशन	0.028%
पानी	0.5%
कुल	**100.00%**

चेतावनी: 1) इस लेबल / पत्रिका में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।
2) मछली और जलीय जीवों के लिए विषाक्त है अतः मत्स्य पालन एवं जल जीवन के पास इस्तेमाल निषेध है।

Marathi

नॅटकोर

एझोक्सीस्ट्रोबिन 11% + टेबुकोनाझोल 18.3% डब्ल्यू/ डब्ल्यू एस सी
(बुरशीनाशक)

अझोक्सीस्ट्रोबिन 11% + टेबुकोनाझोल 18.3% डब्ल्यू/ डब्ल्यू एस सी मिरचीमध्ये फळ सडणे, डोके गळ आणि चूर्णी, द्राक्षांमध्ये डाऊनी, चूर्णी, एपलमध्ये सॅथची (व्हेंचुरिया इनॅक्वेलिस), चूर्णी (पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रिचा), पूर्वीच्या पानांचे गळणे (मार्सोनिना कोरोनारिया), कांद्यामध्ये जांभळा डाग (अल्टरनेरिया पोरी), भातामध्ये शीथ ब्लाइट (राइझोक्टोनिया सोलानी), गव्हामध्ये पिवळा गंज (पुक्किनिया स्ट्रीफोर्मिस), टोमॅटोमध्ये अर्ली ब्लाइट (अल्टरनेरिया सोलानी), बटाटा पीकामध्ये अर्ली ब्लाइट (अल्टरनेरिया सोलानी) व लेट ब्लाइट (फायटोफ्थोरा इंफेस्टेंस) के नियंत्रण हेतु है। यह सूत्रीकरण डब्ल्यू/डब्ल्यू आधार पर एझोक्सीस्ट्रोबिन 12% + टेबुकोनाझोल 20% एससी के समतुल्य है।

शिफारस:

पिके	रोगाचे नाव	मात्रा/हेक्टेयर			पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फवारणीनंतर प्रतीक्षा कालावधी (दिवसांमध्ये)	पुनः प्रवेश कालावधी
		सक्रिय तत्व (ग्रॅम)	फॉर्मुलेशनचे प्रमाण (मि.ली.)	पाण्यात मिसळावे (लिटर)			
मिरची	फळ सडणे, डोके गळ	72 - 120	600 - 1000	500 - 750	5		
द्राक्ष	डाऊनी फफूंदी (प्लास्मोपारा विटीकोला)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
सफरचंद	सॅथ (व्हेंचुरिया इनॅक्वेलिस)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
सफरचंद	चूर्णी फफूंदी (पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रिचा)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
सफरचंद	पूर्वीच्या पानांचे गळणे (मार्सोनिना कोरोनारिया)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7	24	
कांदा	जांभळा डाग (अल्टरनेरिया पोरी)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
भात	शीथ ब्लाइट (राइझोक्टोनिया सोलानी)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
गव्हाचा	पिवळा गंज (पुक्किनिया स्ट्रीफोर्मिस)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
टोमॅटो	अर्ली ब्लाइट (अल्टरनेरिया सोलानी)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
बटाटा	अर्ली ब्लाइट (अल्टरनेरिया सोलानी) लेट ब्लाइट (फायटोफ्थोरा इंफेस्टेंस)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
बटाटा	डाऊनी फफूंदी (पेरोनोस्पोरा स्पार्सा)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	10		
भात	खैरा (उस्टिलाजिनोइडिया विरेंस)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	10		
बीट	सर्कोस्पोरा पानांचे ठिपके (सर्कोस्पोरा बेटिकोला), तांबेरा (यूरोमाइसेस बेटाई), चूर्णी फफूंदी (एरिसिफे बेटाई)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
बीट	मूळ कुजवा (राइझोक्टोनिया सोलानी), रोपे कोलमडणे (राइझोक्टोनिया सोलानी), रोपे कोलमडणे (पिथियम स्पा.)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
बीट	पानांचे ठिपके (रामुलेरिया बेटिकोला), पानांचे ठिपके (फोमा बेटाई), पानांचे ठिपके (स्टेम्फिलियम बोट्रियोसम)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
बीट	पानांचे ठिपके (अल्टरनेरिया स्पा.), पानांचे ठिपके (सर्कोस्पोरा बेटिकोला), पानांचे ठिपके (रामुलेरिया बेटिकोला), पानांचे ठिपके (फोमा बेटाई), पानांचे ठिपके (स्टेम्फिलियम बोट्रियोसम), तांबेरा (यूरोमाइसेस बेटाई), चूर्णी फफूंदी (एरिसिफे बेटाई), मूळ कुजवा (राइझोक्टोनिया सोलानी), रोपे कोलमडणे (राइझोक्टोनिया सोलानी), रोपे कोलमडणे (पिथियम स्पा.)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		

उपयोग कसे करावे: मापलेली बुरशीनाशकाची मात्रा घ्या आणि त्यात थोडे पाणी मिसळा. एक काडी या लोह घेऊन सर्व घटकांचे एकत्र मिश्रण तयार करून घ्या. अशाप्रकारचे द्रावण तयार करून घ्यावे.
उपयोगाची वेळ: पीकावर रोग येण्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक म्हणून फवारणी करावी. १५ दिवसांच्या अंतरानंतर फवारणीचा प्रकार हवामान आणि रोगाच्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने करावा.
उपयोगाची वेळ: प्रतिबंधात्मक म्हणून फवारणी करावी. १५ दिवसांच्या अंतरानंतर फवारणीचा प्रकार हवामान आणि रोगाच्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने करावा.
सावधगिरी: 1. फवारणीच्या वेळेस योग्य श्वसनाचे साधन वापरा. 2. संरक्षणात्मक कपडे आणि रासायनिक प्रतिरोधी बूट घालावे. 3. संरक्षणात्मक हातमोजे वापरावे. 4. केमिकल गॉगल किंवा फेस शील्ड वापरावे.
विषबाधेची लक्षणे: डोळ्यांची चुरचुरे. त्वचेशी संपर्कामुळे संवेदनशीलता निर्माण होऊ शकते.
प्राथमिक उपचार: 1. श्वसनाद्वारे घेतल्यास: व्यक्तीला ताजी हवेत हलवा. व्यक्तीला उबदार आणि आराम द्यावा. श्वसनास अडचण असल्यास ऑक्सिजन द्यावा. डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. 2. गिळल्यास: उलट्या करू नयेत. तोंड भरपूर पाण्याने धुवावे. बेशुद्ध व्यक्तीला कधीही तोंडाद्वारे काही देऊ नये. श्वसनास अडचण असल्यास ऑक्सिजन द्यावा. डॉक्टरांचा सल्ला घेत. 3. त्वचेशी संपर्क: दूषित कपडे काढावे. संपर्क आलेल्या सर्व भागांवर साबण आणि पाण्याने धुवावे. कोमट पाण्याने धुवावे. डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. 4. डोळ्यांशी संपर्क: डोळे भरपूर पाण्याने धुवावे. वेदना कायम राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञाचा सल्ला घ्यावा.
फायटोटॉक्सिसिटी: शिफारशीप्रमाणे वापरल्यास अफायटोटॉक्सिक.
प्रतिविष: विशिष्ट प्रतिविष नाही. लक्षणानुसार उपचार करा आणि सहायक चिकित्सा द्या.
वापरलेले कंटेनरची विल्हेवाट: 1. रिकामे डब्बे पुनः वापरू नयेत. 2. रिकामे डब्बे नष्ट करून ते राहत्या ठिकाणापासून दूर म्हणजेच 1/2 मीटर खोल पुरावे. 3. फवारणीची उरलेली द्रावणे किंवा धोकेदायक पदार्थ हाताळताना सुरक्षित रीतीने हाताळा जेणेकरून पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही.
साठवणीच्या विशेषतांचा: 1. फवारणीचे पदार्थ ज्या ठिकाणी अन्नधान्य, पेय पदार्थ, तंबाखू आणि जनावरांचे खाद्य ठेवले जाते त्या ठिकाणी ठेवू नयेत. 2. बुरशीनाशक मूळ बाटलीमध्ये घट्ट बुचाने बंद करून ठेवावे. लहान मुलांच्या आवाक्यात ठेवू नयेत. 3. साठवणीसाठी असलेल्या खोल्या या व्यवस्थित प्रकाश असलेल्या, कोरड्या, हवेशीर आणि इतक्या मोठ्या असाव्यात जेणेकरून वाफेमुळे संदूषण होणार नाही. 4. बुरशीनाशक वाहतूक करताना अन्नधान्य आणि जनावरांचे खाद्य यांच्या संपर्कात येणार नाही अशा पद्धतीने करावी.
फॉर्मुलेशन / कीटकनाशकाची संरचना:

घटक	w/w
अझोक्सीस्ट्रोबिन a.i.	11.00%
टेबुकोनाजोल a.i.	18.30%
मॅग्नेशियम एलुमिनियम सिलिकेट	0.92%
पॉलीडेसिल एसिटाल डाइएथर	1.83%
मेथिल मेथाक्रिलेट ग्राफ्ट कॉपोलिमर	2.75%
सोडियम एल्किलनैफ्थलीन सल्फोनेट	
हेमिडेथिल अमोनियम	0.92%
डाइमेथिलडोडेसिलामाइन	0.37%
1,2 बेंझिसोथियाझोलिन-3-वन	0.09%
प्रोपिलीन ग्लायकोल	7.30%
हेटेरोपॉलीसॅकराइड 2% सोल्यूशन	0.028%
पाणी	0.5%
एकूण	**100.00%**

सावधगिरी: 1) विशिष्ट पिकांत या लेबल/पत्रिकेव्यतिरिक्त वापरू नये.
2) मासे आणि जलीय जीवांसाठी विषारी आहे त्यामुळे, कारणास्तव जलसाठ्यात वापरायचे नाही.

Gujarati

નેટકોર

એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 11% + ટેબુકોનાઝોલ 18.3% ડબ્લ્યૂ/ ડબ્લ્યૂ એસ સી
(ફૂગનાશક)

એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 11% + ટેબુકોનાઝોલ 18.3% ડબ્લ્યૂ/ ડબ્લ્યૂ એસ સી મરચીમાં ફળ સડો, ડાઉન મિલ્ડયૂ, દ્રાક્ષમાં ડાઉની મિલ્ડયૂ, પાવડરી મિલ્ડયૂ, સફરજનમાં સેથ (વેન્ચુરિયા ઇનેક્વેલિસ), પાવડરી મિલ્ડયૂ (પોડોસ્ફેરા લ્યુકોટ્રિચા), અકાલિક પાંદડા ખરવા (મર્સોનિનાકોરોનારિયા), ડુંગળીમાં જાંબલી ધબ્બો (અલ્ટરનેરિયા પોરી), ચોખામાં શીથ બ્લાઇટ (રાઇઝોક્ટોનિયા સોલાની), ઘઉંમાં પીળો ગંજ (પુક્કિનિયા સ્ટ્રીફોર્મિસ), ટામેટામાં અર્લી બ્લાઇટ (અલ્ટરનેરિયા સોલાની), બટાટા પાકમાં અર્લી બ્લાઇટ (અલ્ટરનેરિયા સોલાની) લેટ બ્લાઇટ (ફાઇટોફ્થોરા ઇન્ફેસ્ટેન્સ) ના નિયંત્રણ માટે છે. આ ફોર્મ્યુલેશન ડબ્લ્યૂ/ડબ્લ્યૂ આધાર પર એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 12% + ટેબુકોનાઝોલ 20% એસસી સમતુલ્ય છે.

ભલામણ:

પાક	રોગનું નામ	માત્રા/હેક્ટેર			પાણીનું પ્રમાણ (લિટર)	અંતિમ છંટકાવ પછી પ્રતીક્ષા સમય (દિવસોમાં)	પુનઃ પ્રવેશ અવધિ
		સક્રિય તત્વ (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશનની માત્રા (મિ.લી.)	પાણીમાં ઘોલ (લિટર)			
મરચી	ફળ સડો, ડાઉન મિલ્ડયૂ	72 - 120	600 - 1000	500 - 750	5		
દ્રાક્ષ	ડાઉની મિલ્ડયૂ (પ્લાસ્મોપારા વિટીકોલા)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
સફરજન	સેથ (સ્કેબ) (વેન્ચુરિયા ઇનેક્વેલિસ)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
સફરજન	પાવડરી મિલ્ડયૂ (પોડોસ્ફેરા લ્યુકોટ્રિચા)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
સફરજન	અકાલિક પાંદડા ખરવા (મર્સોનિનાકોરોનારિયા)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7	24	
ડુંગળી	જાંબલી ધબ્બો (અલ્ટરનેરિયા પોરી)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
ચોખા	શીથ બ્લાઇટ (રાઇઝોક્ટોનિયા સોલાની)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
ઘઉંનો	પીળો ગંજ (પુક્કિનિયા સ્ટ્રીફોર્મિસ)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
ટામેટા	અર્લી બ્લાઇટ (અલ્ટરનેરિયા સોલાની)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
બટાટા	અર્લી બ્લાઇટ (અલ્ટરનેરિયા સોલાની) લેટ બ્લાઇટ (ફાઇટોફ્થોરા ઇન્ફેસ્ટેન્સ)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	7		
બટાટા	ડાઉની ફફૂંદી (પેરોનોસ્પોરા સ્પાર્સા)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	10		
ચોખા	ખૈરા (ઉસ્ટિલાજિનોઇડિયા વિરેન્સ)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500	10		
બીટ	સર્કોસ્પોરા પાંદડાનો ધબ્બો (સર્કોસ્પોરા બેટિકોલા), રતુઆ (યુરોમાઇસેસ બેટાઇ), ચૂર્ણી ફૂગ (એરિસિફે બેટાઇ)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
બીટ	મૂળ સડો (રાઇઝોક્ટોનિયા સોલાની), રોપા ડમ્પિંગ ઓફ (રાઇઝોક્ટોનિયા સોલાની), રોપા ડમ્પિંગ ઓફ (પિથિયમ સ્પા.)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
બીટ	પાંદડાનો ધબ્બો (રામુલેરિયા બેટિકોલા), પાંદડાનો ધબ્બો (ફોમા બેટાઇ), પાંદડાનો ધબ્બો (સ્ટેમ્ફિલિયમ બોટ્રિયોસમ)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		
બીટ	પાંદડાનો ધબ્બો (અલ્ટરનેરિયા સ્પા.), પાંદડાનો ધબ્બો (સર્કોસ્પોરા બેટિકોલા), પાંદડાનો ધબ્બો (રામુલેરિયા બેટિકોલા), પાંદડાનો ધબ્બો (ફોમા બેટાઇ), પાંદડાનો ધબ્બો (સ્ટેમ્ફિલિયમ બોટ્રિયોસમ), રતુઆ (યુરોમાઇસેસ બેટાઇ), ચૂર્ણી ફૂગ (એરિસિફે બેટાઇ), મૂળ સડો (રાઇઝોક્ટોનિયા સોલાની), રોપા ડમ્પિંગ ઓફ (રાઇઝોક્ટોનિયા સોલાની), રોપા ડમ્પિંગ ઓફ (પિથિયમ સ્પા.)	62.5 - 137.25	750 - 1250	500 - 750	10		

ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો: માપેલી ફૂગનાશકની માત્રા લો અને તેમાં થોડું પાણી ઉમેરો. એક લાકડી અથવા સળિયાથી સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી બાકીનું પાણી ઉમેરો, સ્પ્રેયર દ્રાવણ તૈયાર કરવા માટે સારી રીતે હલાવો.
ઉપયોગનો સમય: હવામાન અને રોગના પ્રકોપ પર આધારિત નિવારક રૂપે લાગુ કરો અને 15 દિવસના અંતરે પુનરાવર્તન કરો.
સાવચેતી: 1. સ્પ્રેયિંગ દરમિયાન યોગ્ય શ્વસન ઉપકરણ પહેરો. 2. યોગ્ય રક્ષણાત્મક કપડાં અને રાસાયણિક પ્રતિરોધક બૂટ પહેરો. 3. યોગ્ય મોજાં પહેરો. 4. કેમિકલ ગોગલ્સ અથવા ફેસ શીલ્ડ પહેરો.
ઝેરના લક્ષણો: આંખોમાં બળતરા. ત્વચાના સંપર્કમાં સંવેદનશીલતા.
પ્રાથમિક સારવાર: 1. ઇનહેલેશન: પીડિતને તાજી હવામાં ખસેડો. પીડિતને ગરમ અને આરામ આપો. જો શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી હોય તો ઓક્સિજન આપો. તબીબી સહાય મેળવો. 2. ઇન્જેશન: ઉલટી ન કરાવો. મોંને પુષ્કળ પાણીથી ધોઈ નાખો. ગ્લાસ આપતા પહેલા મોંને કોગળા કરો. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય કંઈ ન આપો. જો શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી હોય તો ઓક્સિજન આપો. તબીબી સહાય મેળવો. 3. ત્વચા સંપર્ક: અસરગ્રસ્ત કપડાં દૂર કરો. સાબુ અને પાણીથી ધોયેલા તમામ ખુલ્લા વિસ્તારને ધોઈ નાખો. ગરમ પાણીથી ધોઈ નાખો. કોઈપણ ફરિયાદ કિસ્સામાં ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો. 4. આંખનો સંપર્ક: આંખને પુષ્કળ પાણીથી ધોઈ નાખો. જો પીડા ચાલુ રહે તો નેત્રરોગ નિષ્ણાતનો સંપર્ક કરો.
ફાઇટોટોક્સિસિટી: ભલામણ મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો બિન-ફાઇટોટોક્સિક.
પ્રતિવિષ: કો