NATGEN®

CHLORANTRANILIPROLE 18.5% w/w SC
(BROAD SPECTRUM INSECTICIDE)

Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC (20%w/v) is a novel substituted anthranilamide insecticide. It is a broad-spectrum insecticide and is recommended for controlling pests of Rice, Sugarcane, Brinjal, Cotton, Soybean, Pigeon pea (Red gram), Bengal gram, Black gram, Chilli, Tomato, Okra, Cabbage, Bitter gourd, Maize & Groundnut.

Recommendation:

Crop	Common name of pest	Dosage per Hectare			Waiting period from last application to Harvest (Days)
		g a.i	Formulation (ml)	Dilution in (ltr)	
Rice	Stem borer *(Scirpophaga incertulas)* Leaf folder *(Cnaphalocorsis medinalis)*	30	150	500	47
Sugarcane	Termite *(Odontotermes obesus/ Microtermes obesi)*	100-125	500-625	1000	208
	Early Shoot Borer *(Chilo infuscatellus)*	75	375	1000	
	Top Borer *(Scirpophaga excerptalis)*	75	375	1000	
Brinjal	Fruit and Shoot borer *(Leucinodes orbonalis)*	40	200	500-750	3
Cotton	American Boll Worm *(Helicoverpa armigera)*, Spotted Boll Worm *(Earias vittella)*, Tobacco Caterpillar *(Spodoptera litura)*	30	150	500	9
Soybean	Green Semilloopers *(Chrysodeixis acuta)* Stem fly Girdle beetle	30	150	500-750	22
Pigeon pea	Gram pod borer *(Helicoverpa armigera)* Pod fly *(Melanagromyza obtusa)*	25	125	500	11
Bengal gram	Pod borer *(Helicoverpa armigera & Spodoptera spp.)*	20	100	500	20
Black gram	Pod borer *(Maruca spp. & Spodoptera litura)*	30	150	500	3
Chilli	Fruit borer *(Helicoverpa armigera)*, Tobacco Caterpillar *(Spodoptera litura, S.exigua)*	30	150	500	3
Tomato	Fruit borer *(Helicoverpa armigera)*	30	150	500	3
Okra	Fruit borer *(Helicoverpa armigera & Earias vittella)*	25	125	500	5
Cabbage	Diamond Back Moth *(Plutella xylostella)*	10	50	500	3
Bittergourd	Fruit borer and leaf caterpillar *(Helicoverpa armigera & Diaphania indica)*	20-25	100-125	500	7
Maize	Spotted stem borer *(Chilo partellus)* Pink stem borer *(Sesamia inferens)*	40	200	500	10
Groundnut	Tobacco caterpillar *(Spodoptera litura)*	30	150	500	28

One kilogram of Chlorantraniliprole 18.5% SC contains 185g of Chlorantraniliprole Technical a.i.

DIRECTION FOR USE: (Method and time of application)

Sugarcane: Sett drenching/Soil drenching in the sugarcane crop for control of Termites, Early shoot borer and Top borer. The application should be done as soil drenching for the control of 3rd, 4th and 5th brood of Top borer in sugarcane in the month of June. **Other crops:** Rice, Cotton, Brinjal, Soybean, Pigeon pea, Bengal gram, Black gram, Chilli, Tomato, Okra, Cabbage, Bitter gourd, Maize & Groundnut. Use as foliar spray at ETL of the pest population.

Spraying equipment: Knapsack sprayer, Foot sprayer.

PHYTOTOXICITY: Not phytotoxic at recommended dosages.

PRECAUTIONS: 1. Read and follow all instructions on the label and leaflet carefully. Save the container with the label to show the physician in case of accidental poisoning. 2. Do not inhale the contents. Wear rubber gloves, goggles, facemask and protective clothing while handling. Avoid remaining in the drift of spray by applying the insecticide with the wind. 3. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while spraying. 4. Do not fill the spray tank beyond 3/4th of its capacity. Clean the blocked nozzle by a thin wire or pin never by blowing the same. 5. In case of any spillage on the body, it should be washed with plenty of water. 6. Always change clothing and take bath as soon as the insecticide treatment is over. 7. Wash hands and unprotected parts of the body before eating, drinking or smoking and after handling. 8. Remove and wash contaminated clothing before reuse. 9. Call a physician immediately if any symptoms of poisoning appear in a person who is using or has recently used this insecticide.

STORAGE AND HANDLING: Do not store or consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material. Store the insecticide in original container only, tightly closed in well built, cool, dry place, well lit and ventilated and should be of sufficient dimensions to avoid contaminations with vapours. The material should be kept under lock and key, away from food, animal feed, other pesticide and fertilizers.

DISPOSAL OF USED CONTAINERS: The packages shall be broken and buried1/2-meter-deep in soil away from habitation. The used packages shall not be left outside to prevent environmental and water pollution. Do not flush to surface water or sanitary sewer system.

Chemical Composition	%w/w
Chlorantraniliprole a.i.	18.5
Methyl methacrylate ethoxylated graft co-polymer	3.0
Ethyleneoxide/propyleneoxide block co-polymer and ethoxylated alcohol	2.0
Attapulgite clay	1.0
Xanthan gum	0.25
1,2- benzisothianzolin-3-one	0.1
Silicone emulsion	0.5
Propylene glycol	6.8
Water	Q.S.
Total	100

SYMPTOMS: Mild eye irritant with blurred vision. Vapour inhalation may result in nasal secretion.

FIRST AID: If inhaled: No specific intervention is indicated as the material is not likely to be hazardous by inhalation. **If on skin:** The material is not likely to be hazardous by skin contact, but cleaning the skin after use is advisable. **If in eyes:** The material is not likely to be hazardous to the eyes, but in case of contact occurs, flush the eyes with plenty of water.

ANTIDOTE: No specific antidote is available. Treat symptomatically.

Cautionary Statement: 1) Not to be used for any other purpose than specified on this Label/Leaflet. 2) Destroy container after use as directed on leaflet. 3) Dangerous to reuse empty container.

Manufactured and Marketed by: Natco Pharma Limited, Natco House, Road No 2, Banjara Hills - 500 034, Hyderabad, Telangana, India. **Factory :** Plot No 3 & 8/1, Sy. No. 56 (P) & 60 (P), APIIC Industrial Park, Attivaram Village, Ozili Mandal, Sri Potti Sri Ramulu (SPSR) Nellore District - 524 421, Andhra Pradesh, India.

നെറ്റ്ജെൻ®

ക്ലോറന്റ്രാനിലിപ്രോൾ 18.5% w/w SC
(ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ഇൻസെക്ടിസൈഡ്)

ക്ലോറന്റ്രാനിലിപ്രോൾ 18.5% w/w SC (20%w/v) ഒരു പുതിയ തരം ആന്ത്രാനിലാമൈഡ് കീടനാശിനി ആണ്. ഇത് ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം കീടനാശിനി ആണ്. നെല്ല്, കരിമ്പ്, വഴുതന, പരുത്തി, സോയാബീൻ, പയർ (ചുവന്ന പയർ), ബംഗാൾ പയർ, കറുത്ത പയർ, മുളക്, തക്കാളി, വെണ്ട, കാബേജ്, കയ്പക്ക, ചോളം, നിലക്കടല എന്നിവയുടെ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ശുപാർശ:

വിള	കീടത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	ഹെക്ടറന്നു പ്രതി ഡോസിൽ			അവസാന പ്രയോഗം മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പു കാലയളവ്
		തീവ്ര (ഏ.ഐ.ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (മില്ലി)	ലായിപ്പിക്കുന്നത് (ലിറ്റർ)	
നെല്ല്	തണ്ടുതുരപ്പൻ (സിർപ്പോഫാഗ ഇൻസെർട്ടുലാസ്) ഇലചുരുട്ടി (കനാഫലോകാസിസ് മെഡിനാലിസ്)	30	150	500	47
കരിമ്പ്	ചിതൽ (ഓഡോണ്ടോട്രൈറ്റർമീസ് ഒബെസസ്/ മൈക്രോടെർമീസ് ഒബെസി) കൂമ്പ് തുരപ്പൻ (ചിലോ ഇൻഫസ്കാറ്റെല്ലസ്) മുകൾ തുരപ്പൻ (സിർപ്പോഫാഗ എക്സെർപ്റ്റാലിസ്)	100-125 75 75	500-625 375 375	1000 1000 1000	208
വഴുതന	കായ, കൂമ്പ് തുരപ്പൻ (ലൂസിനോഡെസ് ഓർബോണാലിസ്)	40	200	500-750	3
പരുത്തി	അമേരിക്കൻ ബോൾ ബേസ (ഹെലിക്കോവേർപ ആർമിജെറ), പുള്ളിക്കുള്ള ബോൾ ബേസ് (ഇറിയസ് വിറ്റെല്ല), പുകയിലയുടെ ബോൾ ബേസ് (സ്പോഡോപ്റ്റെറ ലിറ്റൂറ)	30	150	500	9
സോയാബീൻ	പച്ച നൊട്ടിപ്പുഴുക്കൾ (ക്രിസോഡെക്സിസ് അക്യൂട്ട) തണ്ട് ഈച്ച ഞെരിക്കൽ വണ്ട്	30	150	500-750	22
പയർ (ചുവന്ന പയർ)	കായ്പ്പുഴു (ഹെലിക്കോവേർപ ആർമിജെറ), ഇലമുരുട്ടി (മെലാനഗ്രോമൈസ ഒബ്ടുസ)	25	125	500	11
ബംഗാൾ പയർ	കായ്പ്പുഴു (ഹെലിക്കോവേർപ ആർമിജെറ/ സ്പോഡോപ്റ്റെറ എസ്പി.)	20	100	500	20
കറുത്ത പയർ	കായ്പ്പുഴു (മാരുക എസ്പി./ സ്പോഡോപ്റ്റെറ ലിറ്റൂറ)	30	150	500	3
മുളക്	കായ പുഴുവിന് (ഹെലിക്കോവേർപ ആർമിജെറ), ഇലമുരുട്ടി കാറ്റർപില്ലർ (സ്പോഡോപ്റ്റെറ ലിറ്റൂറ, എസ് എക്സിഗ)	30	150	500	3
തക്കാളി	കായ്പ്പുഴു (ഹെലിക്കോവേർപ ആർമിജെറ)	30	150	500	3
വെണ്ട	കായ പുഴുവിന് (ഹെലിക്കോവേർപ ആർമിജെറ & എറിയസ് വിറ്റെല്ല)	25	125	500	5
കാബേജ്	വജ്രമണ്ഡി യോക്ക് മോത്ത് (പ്ലൂട്ടെല്ല സൈലോസ്റ്റെല്ല)	10	50	500	3
കയ്പക്ക/പീക്കി	കായ പുഴുവും ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴുവും (ഹെലിക്കോവേർപ ആർമിജെറ/ ഡയഫാനിയ ഇൻഡിക്ക)	20-25	100-125	500	7
ചോളം	പുള്ളിക്കുള്ള തണ്ടു തുരപ്പൻ (ചിലോ പാർടെല്ലസ്) പിങ്ക് തണ്ടു തുരപ്പൻ (സെസാമിയ ഇൻഫെറെൻസ്)	40	200	500	20
നിലക്കടല	പുഴുവിനെ കൊല്ലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള (സ്പോഡോപ്റ്റെറ ലിറ്റൂറ)	30	150	500	28

ഒരു കിലോഗ്രാം ക്ലോറാൻട്രാനിലിപ്രോൾ 18.5% എസ്സിയിൽ 185 ഗ്രാം ക്ലോറാൻട്രാനിലിപ്രോൾ ടെക്നിക്കൽ ഏ.ഐ.യെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഉപയോഗനിർദ്ദേശം: (പ്രയോഗിക്കുന്ന രീതിയും സമയവും)

കരിമ്പ്: ചിതലുകൾക്കും, കൂമ്പ് തുരപ്പൻ, മുകൾ തുരപ്പൻ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായി കരിമ്പ് വിളയിൽ കരിമ്പിൻ തണ്ട് നനയ്ക്കുന്നതിന് / മണ്ണ് നനയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജൂൺ മാസത്തിൽ കരിമ്പിലെ മുകൾ തുരപ്പന്റെ 3, 4, 5 ബ്രൂഡുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായി മണ്ണ് നനയ്ക്കലായി പ്രയോഗിക്കണം. മറ്റ് വിളകൾ: നെല്ല് കോട്ടൺ, വഴുതന, സോയാബീൻ, വൻപയർ, കടല, ഉഴുന്ന് , മുളക്, തക്കാളി, വെണ്ട, കാബേജ്, കയ്പക്ക, ചോളം, നിലക്കടല. കീടങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന അളത്തിൽ എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ഇലയിൽ തളിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുക.

സ്പ്രേ ഉപകരണങ്ങൾ: നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ, ഫുട്ട് സ്പ്രേയർ.

സസ്യ വിഷബാധ: ശുപാർശിത അളവിൽ സസ്യവിഷബാധ ഉണ്ടാക്കില്ല

മുൻകരുതലുകൾ: 1. ലേബലിലെയും ലഘുലേഖയിലെയും എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. അപകടകരമായ വിഷബാധ ഉണ്ടായാൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ ലേബൽ അടക്കം കണ്ടെയിനർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. 2. ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം മണത്തു നോക്കരുത് . കൈകൾക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബർ കയ്യുറകൾ,�ോഗിൾസ്, ഫെയ്സ്മാസ്ക്, സംരക്ഷണ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ധരിക്കുക. കീടനാശിനി കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ പ്രയോഗിച്ച് സ്പ്രേയുടെ ധൂളികൾ ശരീരത്തിൽ പറ്റിപിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 3. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ പുകവലിക്കുകയോ ചവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 4. സ്പ്രേ ടാങ്കിന്റെ ശേഷിയുടെ 3/4 ഭാഗത്തിനപ്പുറം നിറയ്ക്കരുത്. തടഞ്ഞ നോസിൽ നേർത്ത വയർ അല്ലെങ്കിൽ പിൻ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. ഒരിക്കലും ഊതി വൃത്തിയാക്കരുത്. 5. ശരീരത്തിൽ തുളുമ്പിയോ തെറിച്ചോ വിണെങ്കിൽ ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം. 6. കീടനാശിനി പ്രയോഗം കഴിഞ്ഞാലുടൻ എല്ലാവിധപ്പോഴും വസ്ത്രം മാറി കുളിക്കുക. 7. കൈകൾക്കും ചെയ്യുന്നതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനോ കുടിക്കുന്നതിനോ പുകവലിക്കുന്നതിനോ കൈകളും ശരീരത്തിന്റെ തുറന്ന ഭാഗങ്ങളും കഴുകുക. 8. പുനരുപയോഗത്തിന് മുമ്പ് മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകണങ്ങൾ. 9. ഈ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിടെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക.

സംഭരണവും കൈകാര്യം ചെയ്യലും: ഭക്ഷണം, പാനീയം, പുകയില എന്നിവ ഈ വസ്തുക്കളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭരിക്കുകയോ അവിടെ വച്ച് കഴിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. കീടനാശിനി അതിന്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടെയ്നറിൽ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുക. നന്നായി അടച്ച് ഉറപ്പുള്ള തണുത്തതും വരണ്ടതുമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. ഈ സ്ഥലം കാറ്റും വെളിച്ചവും കടക്കുന്നതും ഇൽപന്നത്തിന്റെ ബാഷ്പം മൂലമുള്ള മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ മതിയായ വലുപ്പം ഉള്ളതുമായിരിക്കണം. ഭക്ഷണം, കാലിതീറ്റ, മറ്റ് കീടനാശിനി, രാസവളങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകലെ താഴും താക്കോലും ഉപയോഗിച്ച് കീടനാശിനി പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കണം.

നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യൽ: പാക്കേജുകൾ പൊട്ടിച്ച് ജനവാസമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ 1/2 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിടണം. ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ പുറത്തു മുറിച്ചുകളയേണ്ടതാണ്. അധികമായ ലായനികൾ പൊതിയുന്നതിനുള്ള പാക്കേജുകൾ എന്നിവ പാരിസ്ഥിതിക, ജല മലിനീകരണം തടയുന്നതിനായി സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നീക്കംചെയ്യണം. ഉപരിതല ജലത്തിലേക്കോ സാനിറ്ററി മലിനജല സംവിധാനത്തിലേക്കോ ഒഴുക്കരുത്.

രാസഘടന	% ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
ക്ലോറാൻട്രാനിൽപ്രോൾ എ.ഐ	18.5
മെഥൈൽ മെത്തെക്രൈലേറ്റ് ഓത്തോക്സിനൈലേറ്റഡ് ഗ്രാഫിറ്റ്കോ-പോളിമർ	3.0
ഈതൈലീനിയോ ഓക്സൈഡ്/ പ്രൊപ്പൈലെമോക്സൈഡ് ബ്ലോക്കോ-പോളിമർ, ഓത്തോക്സിനൈലേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ	2.0
അട്ടാപുൾഗൈറ്റ് ക്ലേ	1.0
സാന്തൻ ഗം	0.25
1,2-ബെൻസിസോത്തിയാൻസോളിൻ-3-വൺ	0.1
സിലിക്കൺ എമൽഷൻ	0.5
പ്രൊപിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ	6.8
വെള്ളം	ക്യൂഎസ്
ആകെ	**100**

ലക്ഷണങ്ങൾ : കാഴ്ച മങ്ങലും നേരിയ കണ്ണ് പ്രകോപനവും. ഇതിന്റെ ബാഷ്പം ശ്വസിക്കുന്നത് മൂക്കിലെ സ്രവത്തിന് കാരണമായേക്കാം.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ: ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ: മെറ്റീരിയൽ മണത്തു നോക്കുന്നത് അപകടകരമാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ പ്രത്യേക പ്രതിവിധിയൊന്നും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ചർമ്മത്തിലേക്കുകയാണെങ്കിൽ: ചർമ്മ സമ്പർക്കം മൂലം അപകടകരമാന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല, പക്ഷേ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ചർമ്മം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കണ്ണിലാകുകയാണെങ്കിൽ: പദാർത്ഥം കണ്ണുകൾക്ക് അപകടകരമാകാൻ സാധ്യതയില്ല, മറിച്ച് കണ്ണിൽ അകപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണുകൾ കഴുകുക.

മറുമരുന്ന്: നിർദ്ദിഷ്ട മറുമരുന്ന് ലഭ്യമല്ല. രോഗലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

മുൻകരുതൽ പ്രസ്താവന: 1) ഈ ലേബൽ / ലഘുലേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയതല്ലാതെ മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കരുത്. 2) ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കുക. 3) ശൂന്യമായ കണ്ടെയ്നർ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്.

നിർമ്മിച്ച് വിപണനം ചെയ്തത്: നാറ്റ്കോ ഫാർമ ലിമിറ്റഡ്, നാറ്റ്കോ കൗസ്, റോഡ് നമ്പർ 2, ബഞ്ചാര ഹിൽസ്-500 034, ഹൈദരാബാദ്, തെലങ്കാന, ഇന്ത്യ. ഫാക്ടറി: പ്ലോട്ട് നമ്പർ 3-8/1, സി. നമ്പർ 56 (പി) അൻഡ് 60 (പി), എപിഐഐഐസി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, അട്ടിവാരം വില്ലേജ്, ഓസിലി മണ്ഡൽ, ശ്രീ പോട്ടി ശ്രീ രാമുലു (എസ്പിഎസ്ആർ) നെല്ലൂർ ജില്ല - 524 421, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഇന്ത്യ

NATGEN®

CHLORANTRANILIPROLE 18.5% w/w SC
(BROAD SPECTRUM INSECTICIDE)

नैटजेन®

क्लोरेंट्रानिलिप्रोल १८.५% भा./भा. एस सी
(बहुआयामी कीटनाशक)

Direction of use
Read attached leaflet before use.

उपयोग के लिये निर्देश
उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढें

Manufactured and Marketed by:
NATCO Pharma Limited
Natco House, Road No. 2, Banjara Hills,
Hyderabad - 500 034, Telangana, India.
Factory: Plot No. 3 & 8/1, Sy. No. 56 (P) & 60 (P),
APIIC Industrial Park, Athivaram Village, Ozili Mandal,
Sri Potti Sriramulu Nellore District - 524 421,
Andhra Pradesh, India.

उत्पादक और विक्रेता: नैटको फार्मा लिमिटेड
नैटको हाउस, रोड नंबर २, बंजारा हिल्स,
हैदराबाद – ५०० ०३४, तेलंगाना, भारत।
फैक्ट्री: प्लॉट नं ३ और ८/१, सर्वे नं. ५६ (पी) और ६० (पी),
एपीआईआईसी इंडस्ट्रियल पार्क, अत्तिवरम ग्राम,
ओजिली मंडल, श्री पोट्टि श्रीरामुलु नेल्लोर जिला – ५२४ ४२१,
आंध्र प्रदेश, भारत।

www.natcopharma.co.in

Caution : Not to be used for any purpose other than those subscribed on Label & Leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

सावधानियां : लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न और अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं। पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें।

® Registered trademark of Natco Pharma Limited

Customer Care: **Tel.: 040 23546564 / 23600836**
Email: crophealth_support@natcopharma.co.in

6220001

Size : 292mm(L) x 269mm(H)

NATGEN®

CHLORANTRANILIPROLE 18.5% w/w SC
(BROAD SPECTRUM INSECTICIDE)

Recommendation:

फसल	कीट का सामान्य नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा			अंतिम छिड़काव से कटाई तक प्रतीक्षा अवधि (दिनों में)
		ग्राम स. तत्व	विषय (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	
धान	तना छेदक (स्क्रपोफगा इनसर्टुलास तथा पत्ता मोड़क (क्निएफालोसिस मेडिनेलिस)	३०	१५०	५००	४७
गन्ना	दीमक (ओडोंटोटर्मस ओबेसस/माइक्रोटर्मस ओबेसी)	१००-१२५	५००-६२५	१०००	२०८
	कोमल तना छेदक (स्क्रपोफ़ा इन्सरटुलास)	७५	३७५	१०००	
	शीर्ष छेदक (स्क्रपोफगा एक्सरप्टेलिस)	७५	३७५	१०००	
बैंगन	फल तथा तना छेदक (लूसीनोडेस्ड़ा ऑर्बोनेलिस)	४०	२००	५००-७५०	३
कपास	अमेरिकी गोल बुंडी (हेलीकोवर्पा आर्मीजेरा) धब्बेदार बुंडी (इरीयिला विटेल्ला) तम्बाकू इल्ली (स्पोडोप्टेरा लिटूरा)	३०	१५०	५००	९
सोयाबीन	हरे ऊर्ध्व छल्ला कीट (क्रुसोडेक्सिस एक्यूटा), तना मक्खी, गिरडल बीटल	३०	१५०	५००-७५०	२२
पिजन पिस	फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मीजेरा) फली मक्खी (मेलानग्रोमाइजा ओब्टूसा)	२५	१२५	५००	११
बंगाल चना	फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मीजेरा और स्पोडोप्टेरा एस्पी.)	२०	१००	५००	२०
काला चना	फल छेदक (मारूका एस्पीपी और स्पोडोप्टेरा लिटूरा)	३०	१५०	५००	३
मिर्च	फल छेदक, (हेलीकोवर्पा आर्मीजेरा तम्बाकू इल्ली (स्पोडोप्टेरा एक्सिगुआ, एस. लिटूरा)	३०	१५०	५००	३
टमाटर	फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मीजेरा)	३०	१५०	५००	३
भिण्डी	फल छेदक, (हेलीकोवर्पा आर्मीजेरा और इयरियास विटेला)	२५	१२५	५००	५
पत्तागोभी	डायमंडी पतंग (प्लूटेल्ला जइलोस्टेला)	१०	५०	५००	३
करेला	फली इल्ली छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मीजेरा) और फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मीजेरा)	२०-२५	१००-१२५	५००	७
उरीद	हरी पत्तेवाली बुंडी, (स्पोडोप्टेरा लिटूरा)	२०	१००	५००	२०
मिरची	फल पोषकारी अळी, (हेलीकोवर्पा आर्मीजेरा), तंबाकू अळी (स्पोडोप्टेरा लिटूरा, स्पोडोप्टेरा एक्सिगुआ)	३०	१५०	५००	३
मक्का	धब्बेदार तना छेदक (कान्डाला बारटेलस) शुण्डी तना छेदक (सेसामिया इन्फेरेन्स)	४०	२००	५००	२०
मूंगफली	तम्बाकू इल्ली (स्पोडोप्टेरा लिटूरा)	३०	१५०	५००	२८

एक किलोग्राम क्लोरेंट्रानिलिप्रोल १८.५% एस सी में १८५ ग्राम क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल टेक्निकल सक्रिय तत्व मिला है।

इस्तेमाल के निर्देश: (प्रयोग का समय व तरीका)

गन्ना: गन्ने में दीमकों, कोमल तना छेदक तथा शीर्ष छेदक कीटों की रोकथाम के लिए वृत्त–डंठल या मिट्टी को सराबोर करें। गन्ने के शीर्ष छेदक कीटों के तीसरे, चौथे तथा पांचवे ब्रूण अंडज को नियंत्रित करने के लिए जून महीने में मिट्टी को सराबोर करना चाहिए।

अन्य फसल: चावल, कपास, पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, बैंगन, अरहर, चना, उड़द, करेला, भिण्डी, मक्का और मूंगफली: कीट की संख्या जब आर्थिक नुकसान की देहलीज (ई.टी.एल.) पर हो, तो फोलियर स्प्रे यानी पत्तों पर छिड़काव करें।

छिड़काव उपकरण: नैपसैक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर.

पौध – विषाक्तता: सिफारिशी मात्रा प्रयोग करने पर पौधों के लिए विषाक्त नहीं।

सावधानियां: १. लेबल/पत्रक पर छपे सभी निर्देशों का सर्तकतापूर्वक से पालन करें। लेबल सहित डिब्बों को सुरक्षित रखें, ताकि दुर्घटना वश विषाक्तता होने पर डॉक्टर को दिखलाया जाए। २. सामग्री को सूंघना नहीं चाहिए। प्रयोग के समय रबर के दस्ताने, चश्मे, चेहरे का नकाब व सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। हवा की बहाव की दिशा में छिड़काव करके स्प्रे के छींटों से बचने का प्रयास करें। ३. छिड़काव के समय न तो खायें, पियें, धुम्रपान करें, न ही तंबाखू पान चबाएं। ४. स्प्रे टैंक को ३/४ से ज्यादा क्षमता में नहीं भरें। नोजल में कपाएं के फँसने पर मुह से न फूंखे बल्कि पतले तार या पिन से साफ करें। ५. शरीर पर छलकन गिरने की हालत में, खूब सारे पानी से साफ करें। ६. छिड़काव पूरा होते ही हमेशा कपड़े बदलें और नहाएं। ७. खाने, पीने धुम्रपान से पहले तथा प्रयोग के बाद शरीर के खुले हिस्सों व हाथ–पैर को अच्छी तरह धो लें। ८. दुबारा इस्तेमाल करने से पहले दूषित कपड़े निकाल कर धो लें। ९. जिस किसी ने इस कीटनाशक को हाल ही में इस्तेमाल किया है या कर रहा है, उस पर विषाक्तता के लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर को बुलाएं।

भण्डारण और प्रयोग: इस सामग्री से संदूषित, भोजन, पेय सामग्री या तंबाकू का सेवन न करें। कीटनाशक सामग्री को उनके मूल डिब्बे में, अच्छी तरह से बंद करके ठंडी, सूखी जगह में ऐसे कमरे या परिसर में रखना चाहिए जो कि हवादार हो, लंबी चौड़ी हो और जिसे बंद किया जा सके, ताकि उसकी वाष्प से संदूषण न फैले। कीटनाशक सामग्री को भोजन, जानवरों के चारों, अन्य कीटनाशकों और खादों से अलग ताला–चाबी की व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाना चाहिए।

निपटान: खाली डिब्बो को तोड़कर जमीन में १/२ मीटर गहराई मे निवास स्थान से दूर मिट्टी मे गाड़ दें। खाली डिब्बे को दुबारा इस्तेमाल के लिए बाहर ना छोड़े। खाली डिब्बे, अतिरिक्त बची हुई सामग्री तथा मशीन के धोवन के पानी को इस तरह सुरक्षित ढंग से निपटाये कि पर्यावरण व पानी प्रदूषित न हो। निपटान के पानी को पानी की सतह या सफाई–गटर निकास सिस्टम से बचना चाहिए।

रासायनिक संरचना	% भा/भा
क्लोरेंट्रानिलिप्रोल सक्रिय तत्व	१८.५
मिथाइल मिथाक्रायलेट इथोक्सीलेटेड ग्राफ्ट सह–पॉलिमर का निरपेः	३.०
ईथाइलीन ऑक्साइड/प्रोपाइलीन ऑक्साइड ब्लॉक सह–पॉलिमर पिंडक तथा इथोक्सीलेटेड अल्कोहोल	२.०
अटपुलगाइट क्ले	१.०
ज़ैनथेन गॉंद	०.२५
१,२ बेन्ज़ीसोथियाज़ोलिन–३–ओन:	०.१
सिलिकॉन इमल्शन	०.५
प्रोपाइलीन ग्लाइकोल	६.८
जल	पर्याप्त मात्रा
कुल	१००

लक्षण: आंख में हलकी जलन व धुंधला दिखना। वाष्प सांस में जाने पर नाक से पानी बह सकता है।

प्राथमिक उपचार: यदि सांस में गई हो: कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती क्योंकि सामग्री सांस में जाने पर इतनी खतरनाक नहीं है। **त्वचा पर संपर्क:** दूषित होने से सामग्री इतनी खतरनाक नहीं हो सकती। फिर भी, त्वचा को साफ करने की सिफारिश की जाती है। **आंख से संपर्क होने पर:** यह सामग्री इतनी खतरनाक होने की संभावना नहीं रखती। फिर भी संपर्क का असर दिखे, तो खूब सारे पानी से आंखों का प्रक्षालन करें।

विषनाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षण के अनुसार इलाज करें।

सावधानियाँ कथन: इस लेबल या पर्ची पर दिए गए उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद डिब्बों को नष्ट कर दें। खाली डिब्बों का दुबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है।

निर्माता व विक्रेता: नाटको फार्मा लिमिटेड, नाटको हाउस, रोड नंबर २, बंजारा हिल्स–५०००३४, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत.
फैक्टरी: प्लॉट नंबर ३ और ८/१, एसवाय नं. ५६ (पी), ६० (पी), एपीआईआईसी इंडस्ट्रियल पार्क, अत्तिवरम ग्राम, ओजिली मंडल, श्री पोट्टी श्री रामुलु (एसपीएसआर) नेल्लोर ज़िला–५२४४२१, आंध्र प्रदेश, भारत.

नॅटजेन

क्लोरॅन्ट्रानिलिप्रोल १८.५% व/व एस सी
(बहुआयामी कीटनाशक)

क्लोरॅन्ट्रानिलिप्रोल १८.५% व/व एससी (२०% मा/व.) एक नाविन्यपूर्ण ॲन्थ्रॅनिलीक डायमाईड कीटकनाशक आहे. हे एक व्यापक प्रभावी परिणाम करणारे कीटकनाशक आहे. ज्याची शिफ

NATCO Crop Health Sciences

NATGEN®

CHLORANTRANILIPROLE 18.5% w/w SC

(BROAD SPECTRUM INSECTICIDE)

ನಾಟ್‌ಜೆನ್

ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ
(ವಿಸ್ತೃತ ವರ್ಣಪಟ ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% ಡಬ್ಲ್ಯೂ / ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ (20% ಡಬ್ಲ್ಯೂ /ವಿ) ಅನಿಲ ಆಂಥ್ರಾನಿಲಿಕ್ ಡೈ ಎಮೈಡ್ & ಕೊತ್ತು ವಿಷ್ಟ ವರ್ಣಪಟ ಕೀಟನಾಶಕಾದಿ, ದಿನ್ನು ವಲಿ, ಕ್ಯಾಬೆಜ್, ಎತ್ತ, ವೆಂಡಿ, ಟಮೆಟಾ, ಮಿರಪ, ಶಾಯಾಪಿನ್, ವಂಗ, ಕಂದಿ, ಕಾಗ, ಮಿನುಮು, ಕಾಕರ, ಬೆಂಡ, ಮುಕ್ಕಳ್ಳಿನ್ನು ಮತ್ತು ವೆರುಸಗ ಎಂಬಲಣಾಂಶಿಂದ ವಿಡಿಪೆಡಲು ಅಡಿಕಟ್ಟುಲಪ್ಪೆಸಿಫಾಯು ವೆಯಬಡುತುಂದಿ.

ಎಂಬ	ವಿಡಿಪೆಪ್ಪಿ ಎಂಬಾನ್ಗಾಗಿ ತಿಂಡಿ ವಿಯ	ವೀಳ್ಳಾಯು ಮೊತ್ತಾಯು			ಎಂಬಿನ್ ಸಿಂಬಿ ಲಿ ಕಾಂಬಾಯು 16ರಿ 25 ಕಿಲೋಲಿ ಮಾಯಂ (ಲೀಸಲಿ)
	ಎಎ. (ಗ್ರಾಮುಲಿ)	ಸಾಳಿಕಿಯ (ಮಿ.ಮೀ.)	ಕಾಣಿಯ (ಮಿಲಿ.)	ಎಂಬಿಯಾಯು (ಕಿಲ್ಲಾಮಿ)	
ವಿಡಿ	ಕಾಯಿಯಾಯು ಎಂಬಾಯು ಮತಿಯಾಯ ಎಂಬಾಯು ಕೆಂಗಾ ಅಂ ಮಿಲ್ಲ ಎಂಬಾಯು ಕೆಂಗಾ ತಾಯು ತಿಂಬಾ	30	150	500	47
ವೆಂಡಿ	ವಿಡಿಎಂಬಾಯು, ಪಿಕ್ ಎಂಬಾಯು, ಮಿಲ್ಲಎಂಬಾಯು ಎಂಬಾಯು, ಕೆಂಗಾ ಮಿಲ್ಲಎಂಬಾಯು ಎಂಬಾಯು ಕೆಂಗಾ ಮಿಲ್ಲಎಂಬಾಯು ಎಂಬಾಯು ಕೆಂಗಾ ಎಂಬಾಯು ಎಂಬಾಯು	100-125 75 75	500-625 375 375	1000 1000 1000	208
ವಂಗಾಯು	ಕಾಯಿಯಾ ಮತಿಯಾಯ ಎಂಬಾಯು	40	200	500-750	3
ಎತ್ತಿ	ಕಾಯಿಯಾಯು ಎಂಬಾಯು, ಅಂಎತ್ತ ಎಂಬಾಯು ಕೆಂಗಾ ವಿಎತ್ತ ಎಂಬಾಯು, ಎಂಗಾ ಕಾಳ್ಳಿ ಎಂಬಾಯು	30	150	500	9
ಕ್ಯಾಬೆಜಿನ್	ಕಾಗಿ ಎಂಬಾಯು (ಕ್ರೂಸಿಫೆರಿ ಎಟ್ಟಾಲ್), ಕಾಯಿಯ ಅಂ, ವಿಂಡಿ ಎಂಬಾಯು	30	150	500-750	22
ಕುಂದಿ	ಕಾಯಿಯಾಯು ಎಂಬಾಯು (ಇಂಡೆಕೆಗಿ ಎಟ್ಟಾಲ್), ಕಾಯಿಯಾ(ಮೊಂಗಿನ್ ಮೀಟ ಒಂಬಾಯ್ಗಾ)	30	150	500-750	29
ಕಗಗ	ಕಾಯಿಯಾಯು ಎಂಬಾಯು (ಇಂಡೆಕೆಗಿ ಅಟ್ಟಿಗಿ ಕಾಗ), ಕಾಯಿಯಾ ಕಾಗ)	25	125	500	11
ಮಿಮಮು	ಕಾಯಿ ಕೊಂಬಾ ಎಂಬಾಯು (ಎಂಗಾಯ ಕಾಗ), ಕಾಯಿಯಾ ಕಾಗ)	20	100	500	20
ಮಿಂಬ	ಕಾಯಿಯಾಯು ಎಂಬಾಯು (ಇಂಡೆಕೆಗಿ ಅಟ್ಟಿಗಿ), ಗಿಂಗಿಯಾಯು, (ಕ್ರಾಸ್ಟಾಲ್ ಕೆಂಬಾ, ಕಾಯಿಯಾ ಎಕ್ಸಿಲಿ)	30	150	500	3
ಎಮಿಯಾ	ಕಾಯಿಯಾಯು ಎಂಬಾಯು (ಇಂಡೆಕೆಗಿ ಅಟ್ಟಿಗಿ)	30	150	500	3
ಮೊಂಡ	ಕಾಯಿ ಕೊಂಬಾ ಎಂಬಾಯು (ಇಂಡೆಕೆಗಿ ಅಟ್ಟಿಗಿ)	25	125	500	5
ಕ್ಯಾಪಿಕಿ	ಪಿಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಿಗಿ (ಸ್ಪೋಡಾಪ್ಟಿರ ಲಿಟುರಾ)	10	50	500	3
ಕಾಸಿ	ಕಾಯಿಯಾಯು ಎಂಬಾಯು ಮತಿಯಾಯ ಎಂಬಾಯು ಕೆಂಗಾ ಕಾಯಿಯಾ ಎಂಬಾಯು (ಗಿಂಗಿಯಾ ಎಂಬಾಯು) ಕಾಯಿಯಾ ಎಂಬಾಯು ಕೆಂಗಾ ಕಾಯಿಯಾ ಎಂಬಾಯು	20-25	100-125	500	7
ಮಿಳ್ಳಗಿನ್ನಿ	ಮಿಂಬಾ ಮಿಂಬ್ಬು ಎಂಬಾಯು (ಇಂಡೆಕೆಗಿ ಅಟ್ಟಿಗಿ) ಕಾಯಿಯಾ ಎಂಬಾಯು ಕೆಂಗಾ ಕಾಯಿಯಾ ಎಂಬಾಯು	40	200	500	10
ಕೆಂಬಾಯು	ಎಂಗಾಯು ಕಾಳ್ಳಿ ಎಂಬಾಯು (ಇಂಡೆಕೆಗಿ ಅಟ್ಟಿಗಿ)	30	150	500	28

ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5 % ಎಸ್‌ಸಿ ನಂದು 185 ಗ್ರಾಮುಲ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿ. ವಿ. ಕೆಂಬು.

ವಾಡುಬುಸುಸಾವಲು: (ಸರಿ ವಿಧಾನಮು ಮತಿಯಾವಿ ಸಮಯಮು)

ಕೆಂಬು: ಪಿಂಬು ಎಂಬಾಯು ಮತ್ತಾಯಾ ಮೆರಿ ವಿಡಿ ಎಂಬಾಯು ಮತಿಯಾಯ ಪಿಕ್ ಎಂಬಾಯು, ಅಲಗೌ ಮಿಯ್ಯಂದಾಯು ಎಂಬಾಯು ಕೆಂಗಾ ಮತ್ತಾಯಾ ಎಂಬಾಯು ಅರಿಕಟ್ಟುಲಪ್ಪಿ, ಎಂಬಾಯು ಎಂಬಿಗಿ 30 ಮತಿಯಾ 40 ದಿನಲು ಅರಿಕಟ್ಟುಲಪ್ಪಿ ಜಾನ್ ವಿಂಬಲ್ ತೆಲಡುವುದೂ ಕೆಂಗಾ ಮಿಯ್ಯ ಕಡುವುದೂ ದಿನ್ನು ವಾಡಾವಿ ನಿಲಾಯಿ ವೆಯಬಡುತುಂದಿ.

ಇತರ ಪಂಟಲು: (ವಿಡಿ, ವೆಡ್ಡಿ, ಕ್ಯಾಬೆಜಿ, ಎಮಾಮ, మిరప, సాయాబీన్, వంగ, కంది, శనగ, మినుము, కాకర, బెండ, ముక్కజొన్న మరియు వేరుశనగ పంటలనాశించే పిడిపీడలను అరికట్టుటకు సిఫారసు చేయబడుతుంది.

ఇతర పంటలు: (పిడి, వెడ్డి, క్యాబేజి, టమాట, మిరప, సాయాబీన్, వంగ, కంది, శనగ, మినుము, కాకర, బెండ, ముక్కజొన్న మరియు వేరుశనగ) దిన్ను అణ్ణవు పరిమితి శ్రేయి వెడ్డి కొయగుల, ఎత్తమాయి మరియు పిడిపురుగు, మిరపకి కాయతొలుచు పురుగుకి, పత్తిలో పిడిపురుగు గాలిబాధన్ను మామకొరి చల్లకోవాలి. ఉద్యాన దిని తుంపర్లు మిదమడకుండా కాపాడుకోవాలి. 3. దిన్ను వెడ్డిలన్నుదు పిడిపిన తరువాత, ప్రాణ్రాలం లేదా రుమలపాటుల నమలడం మొదలు పనుల చేయరాదు. 4) దిన్ను లాంబడా 3/4 పంతంకు మించి నిలవరాదు. పాడుకుణుపు నాతిదే పిడిపిన వెడ్డి మరియు ఉపరాగం. 5. ఒకవేళ పిడిపిన తాలంగు శరీరం మీద పడితే, వెంటనే శుభ్రమైన నీటితో శుభ్రపరుచుకోవాలి. 6. ఈ కీటకానికి చల్లుకున్న వెంటనే బట్టలు తీసివేసి శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి. 7. పిడిపి పిడుగు, ప్రాణాలు లేదా ప్రాణహానికి ముందు మరియు చల్లుకున్న వెంట వెంటనే చేతులన్ని మరియు కప్పుకోవడ తరిగి ధ్రాణాలు శుభ్రపరుచుకోవాలి. 8. కలుషితమైన బట్టల్ని తిరిగి వాడటకు ముందు తప్పక ఉతుకోవాలి. 9. మందును చల్లేటప్పుడు లేదా ఈ మధ్య చల్లిన వారికి పిడిపిన సిబ్బందులు కనబడుతుంటే వెంటనే డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి.

నిల్వ మరియు నిర్వహణ: దిన్ను ఆహారపదార్థాలు నిల్వచేసేచోట నిల్వచేయకండి. ఆలాగే దిని వెంట కలుషితమైన పిడిపులాలో పిడిపిన తినడం, త్రాగడం లేదా పాడ్రాణులందాంచే సమయ పేయడం. ఈ కీటకానికి వాటియొక్క బహిరంగ డబ్బాలలోనే నిల్వచేసి వుంచాలి. డబ్బాల మూతగట్టిగా బిగించి ఉంచి, మంచి గట్టి కప్పులలో, చల్లగా, పాడిగాప్పు, జాగా లాంటి పొలుతుగు ప్రదేశంలో నిల్వచేయాలి. ఇలా నిల్వ చేయడం వల్లా పిడి ఆరిపి వెంట పిడిపిలు కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ఈ కీటకానికిగల డబ్బాలను వాటి యొక్క పరిధిలను మరియు పెట్రోల్బర్న్ కేటగిరి అమలులలో పెట్టి తాలు మీద పిగిపింది. అంతేకాక దిని ఆహారపదార్థాలు, పశువులలాగా, ఇతర కీటకాశాలు మరియు పెట్టెలన్నిటు దూరంగా నిల్వ చేయాలి.

భూమి దున్నుట పాలనియు విధానము: భూమి దున్నుటను తిరిగి ఏ విధంగానూ వాడాలు. భూమి దున్నుట పరులకోట్టి మనమ్మ సంవాహాలకి దూరంగా 1/2 మీటరు లోతులో గొయ్యి తవ్వి పాతిపెట్టి, దిన్ను లెవ్వ చేయడం లేదా పాడియాలు దాన్ని పరిపాలు, దిన్ను పిడి పరిచలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవాలి. దిన్ను చెరువులో, నదులో లేదా వాగులో ఇలాంటి కాలువలో పారలాదన్నే పరిచలాదు.

రసాయనిక మిశ్రమము	% బి/ బి
క్లోరాంథ్రానిలిప్రోల్ సం:	18.5 %
మిథైల్ మిథా ఫ్రైల్ ఎథైల్‌లిథిక్ :	3.0
గ్రాన్స్ కొలాయిస్ ఇథిలీన్ ఆక్సైడ్ ప్రాపైలీన్ ఆక్సైడ్ బ్లాక్ కోపాలిమర్ మరియు ఎథోక్సిలేటెడ్ ఆల్కహాల్	2.0
సోడియం	0.25
సిలికా	0.1
సిలికోన్ నురుగు	0.5
ప్రొపైలీన్‌గ్లైకోల్:	6.8
నీరు:	తయారికి సాలినంత
మొత్తం:	100

విషి లక్షణాలు: ఒక మొత్తగా కళ్ళలో మరియు చర్మపై మరియు పూయండి. దిని ఆరిపి పిట్సుకట్టుతుంది, నాసిక రంధ్రాల మండే విధం కాదుమరియు.

ప్రత్యుపచికిత్స: చర్యనికి అంటితే: చర్యానికి అంటితే వెంటనే నీళ్ళతో, విటితో శుభ్రపర్చుకోవడం,**కంటికి అంటితే :** 15 నిమిషాల పాటు శుభ్రపర విటితో కడుగుకోవలెను. **ఒకవేళ పీల్చితే:** గాలి, వెలుతురు గల ప్రదేశంలో ఉంచవలెను. ఒకవేళ ఇంకా శ్వాస పీల్చుకోవడం పక్షికిలో ఉంటే స్త్రీతెలుగా శ్వాస అందించవలెను. **ఒకవేళ మింగితే:** ఒకటో మంచి రెండు గ్లాసుల నీరు త్రాగించి వాంతి చేయించవలెను. ఒకవేళ అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతి చేయించరాదు. ఇబుంటంటే పక్షికిలో వాంతి పెట్టడంతో పిట్సు చేయించవలెను. ఒకవేళ అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతి చేయించరాదు. ఇబుంటంటే పక్షికిలో వాంతి పెట్టడంతో ఊపిరితిత్తులలోకి వెళ్ళి తాలు పిగిపింది.

వినియోగ: ప్రత్యేకిత ఫలానా పిరుగుకు లంబూ మిగి లేదా విషలక్షణాలు బట్టి పిట్సు జరిపించాలి.

హెచ్చరిక: ఈ లేబుల్/కరపత్రం పై సిఫారసు చేయబడిన పంటలకు తప్ప వేరే పంటలకు ఉపయోగించరాదు. కరపత్రపు నిర్దేశించిన విధంగా ఉపయోగించిన తర్వాత దున్నాను నాశనం చేయండి. భూమి దున్నుటను తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం.

మార్కెట్ మరియు తయారుచేసినవారు: నాట్కో ఫార్మా లిమిటెడ్, నాట్కో, నాట్కో భవన్, కోట్ల నం. 2, బంజారా హిల్స్- 500 034, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా. **కార్ఖానా చిరునామా:** సర్వే నం. 3 మరియు 8/1, నెర్జ నం. 56 (పి), 60 (పి), ఎపిఐఐసి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్, ఆత్మకూరు గ్రామం, ఓజిలి మండలం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు (ఎన్‌సిఎల్) నెల్లూరు జిల్లా-524 421, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇండియా.

ನಾಟ್‌ಜೆನ್

ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ
(ಬಾಹತ್ತು ಸೆಯಲಾಠನುಂ ಪ್ರಸಿಕಿಕೊಲಲಿ)

ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% ಎಸ್/ಎ ಎಸಿಸಿ (20% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ವಿ) ಅನಿಲ ಆಂಥ್ರಾನಿಲಿಕ್ ಡೈ ಎಮೈಡ್ & ಕೊತ್ತು ವಿಷ್ಟ ವರ್ಣಪಟ ಕೀಟನಾಶಕಾದಿ, ದಿನ್ನು ವಲಿ, ಕ್ಯಾಬೆಜಿ, ಎತ್ತ, ವೆಂಡಿ, ಟಮೆಟಾ, మిరప, శాయాబీన్, వంగ, కంది, శనగ, మినుము, కాకర, బెండ, ముక్కజొన్న మరియు వేరుశనగ పంటలనాశించే పిడిపీడలను అరికట్టుటకు సిఫారసు చేయబడుతుంది.

ఇతర పంటలు: (పిడి, వెడ్డి, క్యాబేజి, టమాట, మిరప, సాయాబీన్, వంగ, కంది, శనగ, మినుము, కాకర, బెండ, ముక్కజొన్న మరియు వేరుశనగ) దిన్ను అణ్ణవు పరిమితి శ్రేయి వెడ్డి కొయగుల, ఎత్తమాయి మరియు పిడిపురుగు, మిరపకి కాయతొలుచు పురుగుకి, పత్తిలో పిడిపురుగు గాలిబాధన్ను మామకొరి చల్లకోవాలి. ఉద్యాన దిని తుంపర్లు మిదమడకుండా కాపాడుకోవాలి. 3. దిన్ను వెడ్డిలన్నుదు పిడిపిన తరువాత, ప్రాణ్రాలం లేదా రుమలపాటుల నమలడం మొదలు పనుల చేయరాదు. 4) దిన్ను లాంబడా 3/4 పంతంకు మించి నిలవరాదు. పాడుకుణుపు నాతిదే పిడిపిన వెడ్డి మరియు ఉపరాగం. 5. ఒకవేళ పిడిపిన తాలంగు శరీరం మీద పడితే, వెంటనే శుభ్రమైన నీటితో శుభ్రపరుచుకోవాలి. 6. ఈ కీటకానికి చల్లుకున్న వెంటనే బట్టలు తీసివేసి శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి. 7. పిడిపి పిడుగు, ప్రాణాలు లేదా ప్రాణహానికి ముందు మరియు చల్లుకున్న వెంట వెంటనే చేతులన్ని మరియు కప్పుకోవడ తరిగి ధ్రాణాలు శుభ్రపరుచుకోవాలి. 8. కలుషితమైన బట్టల్ని తిరిగి వాడటకు ముందు తప్పక ఉతుకోవాలి. 9. ఈ మందును చల్లేటప్పుడు లేదా ఈ మధ్య చల్లిన వారికి పిడిపిన సిబ్బందులు కనబడుతుంటే వెంటనే డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి.

నిల్వ మరియు నిర్వహణ: దిన్ను ఆహారపదార్థాలు నిల్వచేసేచోట నిల్వచేయకండి. ఆలాగే దిని వెంట కలుషితమైన పిడిపులాలో పిడిపిన తినడం, త్రాగడం లేదా పాడ్రాణులందాంచే సమయ పేయడం. ఈ కీటకానికి వాటియొక్క బహిరంగ డబ్బాలలోనే నిల్వచేసి వుంచాలి. డబ్బాల మూతగట్టిగా బిగించి ఉంచి, మంచి గట్టి కప్పులలో, చల్లగా, పాడిగాప్పు, జాగా లాంటి పొలుతుగు ప్రదేశంలో నిల్వచేయాలి. ఇలా నిల్వ చేయడం వల్లా పిడి ఆరిపి వెంట పిడిపిలు కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ఈ కీటకానికిగల డబ్బాలను వాటి యొక్క పరిధిలను మరియు నెర్జాప్పట్టి కేటగిరి అమలులలో పెట్టి తాలు మీద పిగిపింది. అంతేకాక దిని ఆహారపదార్థాలు, పశువులలాగా, ఇతర కీటకాశాలు మరియు పెట్టెలన్నిటు దూరంగా నిల్వ చేయాలి.

భూమి దున్నుట పాలనియు విధానము: భూమి దున్నుటను తిరిగి ఏ విధంగానూ వాడాలు. భూమి దున్నుట పరులకోట్టి మనమ్మ సంవాహాలకి దూరంగా 1/2 మీటరు లోతులో గొయ్యి తవ్వి పాతిపెట్టి, దిన్ను లెవ్వ చేయడం లేదా పాడియాలు దాన్ని పరిపాలు, దిన్ను పిడి పరిచలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవాలి. దిన్ను చెరువులో, నదులో లేదా వాగులో ఇలాంటి కాలువలో పారలాదన్నే పరిచలాదు.

రసాయనిక మిశ్రమము	% బి/ బి
క్లోరాంథ్రానిలిప్రోల్ సం:	18.5 %
మిథైల్ మిథా ఫ్రైల్ ఎథైల్‌లిథిక్ :	3.0
గ్రాన్స్ కొలాయిస్ ఇథిలీన్ ఆక్సైడ్ ప్రాపైలీన్ ఆక్సైడ్ బ్లాక్ కోపాలిమర్ మరియు ఎథోక్సిలేటెడ్ ఆల్కహాల్	2.0
సోడియం	0.25
సిలికా	0.1
సిలికోన్ నురుగు	0.5
ప్రొపైలీన్‌గ్లైకోల్:	6.8
నీరు:	తయారికి సాలినంత
మొత్తం:	100

విషి లక్షణాలు: ఒక మొత్తగా కళ్ళలో మరియు చర్మపై మరియు పూయండి. దిని ఆరిపి పిట్సుకట్టుతుంది, నాసిక రంధ్రాల మండే విధం కాదుమరియు.

ప్రత్యుపచికిత్స: చర్యనికి అంటితే: చర్యానికి అంటితే వెంటనే నీళ్ళతో, విటితో శుభ్రపర్చుకోవడం,**కంటికి అంటితే :** 15 నిమిషాల పాటు శుభ్రపర విటితో కడుగుకోవలెను. **ఒకవేళ పీల్చితే:** గాలి, వెలుతురు గల ప్రదేశంలో ఉంచవలెను. ఒకవేళ ఇంకా శ్వాస పీల్చుకోవడం పక్షికిలో ఉంటే స్త్రీతెలుగా శ్వాస అందించవలెను. **ఒకవేళ మింగితే:** ఒకటో మంచి రెండు గ్లాసుల నీరు త్రాగించి వాంతి చేయించవలెను. ఒకవేళ అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతి చేయించరాదు. ఇబుంటంటే పక్షికిలో వాంతి పెట్టడంతో పిట్సు చేయించవలెను. ఒకవేళ అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతి చేయించరాదు. ఇబుంటంటే పక్షికిలో వాంతి పెట్టడంతో ఊపిరితిత్తులలోకి వెళ్ళి తాలు పిగిపింది.

వినియోగ: ప్రత్యేకిత ఫలానా పిరుగుకు లంబూ మిగి లేదా విషలక్షణాలు బట్టి పిట్సు జరిపించాలి.

హెచ్చరిక: ఈ లేబుల్/కరపత్రం పై సిఫారసు చేయబడిన పంటలకు తప్ప వేరే పంటలకు ఉపయోగించరాదు. కరపత్రపు నిర్దేశించిన విధంగా ఉపయోగించిన తర్వాత దున్నాను నాశనం చేయండి. భూమి దున్నుటను తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం.

మార్కెట్ మరియు తయారుచేసినవారు: నాట్కో ఫార్మా లిమిటెడ్, నాట్కో, నాట్కో భవన్, కోట్ల నం. 2, బంజారా హిల్స్- 500 034, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా. **కార్ఖానా చిరునామా:** సర్వే నం. 3 మరియు 8/1, నెర్జ నం. 56 (పి), 60 (పి), ఎపిఐఐసి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్, ఆత్మకూరు గ్రామం, ఓజిలి మండలం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు (ఎన్‌సిఎల్) నెల్లూరు జిల్లా-524 421, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇండియా.

ನ್ಯಾಟ್‌ಜೀನ್

ಕ್ಲೊರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಸಿ
(ವಿಶಾಲತೆಗಳಿಯ ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕ್ಲೊರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಸಿ (20% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ವಿ) ಕ್ಲೊರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಎಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಪರಿಣತ ಮಿಶ್ರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಂಥ್ರಾನಿಲಿಕ್ ಡೈಆಮೈಡ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದುಂದು ವಿಶಾಲತೆಗಳಿಯ ಕೃಷಿ ಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದಿದೆ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಭತ್ತ, ಎಲೆಕೋಸು, ಹತ್ತಿ, ಕಬ್ಬು, ಬೆಂಡೆಯ ಬೋಳ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸೊಯಾಬೀನ್, ಬದನೆ, ತೊಗರಿ, ಕಡಲೆ, ಉಂಡೆ, ಜಾಗೇಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಡೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇತರ ಬೆಳೆಗಳು: (ಪಿಡಿ, ಪತ್ತಿಕ್ಕಿ, ಗ್ರೂಬೆ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಬದನೆ, ಮೆಣಸಿನ, ಸೊಯಾಬೀನ್, ತೊಗರಿ, ಕಡಲೆ, ಉಂಡೆ, ಜಾಗೇಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆ) ದಿನ್ನು ಪಿಡಿಪುದು, ಮುಖಂಡ ಕೊಂಬು, ಕಠಿರಾಕಿ ಗಿಡಲಾಯಿಪಿ ಧರಿಂದಾಕಿ. ದಿನ್ನು ವೆಡ್ಡಿಲನ್ನುದು ಗಾಲಿವಾಯಿನ್ನು ಮಾಯಿಕಾ ಚಲ್ಲಕೊಳಿ. ಉದ್ಯಾನ ದಿನಿ ತುಂತುರು ಮಿದಮಡಕುಂದಾ ಕಾಪಾಡುಕೊಳ್ಳು. 3. ದಿನ್ನು ವೆಡ್ಡಿಲನ್ನುದು ನಿಡಾನ ತರುವಾಯ ಪ್ರಾಣಾಲಂ లేదా ರುಮಲಪಾಟುల నమలడం మొదలు పనుల చేయరాదు. 4) ದಿನ್ನು ಲಾಂಬಡಾ 3/4 ಪಂಟಂಕು ಮಿಂದು ನಿಲವರಾದು. ಪಾಡುಕುಣುಪು నాతిదే పిడిపిన వెడ్డి మరియు ఉపరాగం. 5. ಒಕವೇ ಪಿಡಿಪಿನ ತಾಲಂಗು ಶರೀರం మీద పడితే, వెంటనే శుభ్రమైన నీటితో శుభ్రపరుచుకోవాలి. 6. ఈ కీటకానికి చల్లుకున్న వెంటనే బట్టలు తీసివేసి శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి. 7. పిడిపి పిడుగు, ప్రాణాలు లేదా ప్రాణహానికి ముందు మరియు చల్లుకున్న వెంట వెంటనే చేతులన్ని మరియు కప్పుకోవడ తరిగి ధ్రాణాలు శుభ్రపరుచుకోవాలి. 8. కలుషితమైన బట్టల్ని తిరిగి వాడటకు ముందు తప్పక ఉతుకోవాలి. 9. ఈ మందును చల్లేటప్పుడు లేదా ఈ మధ్య చల్లిన వారికి పిడిపిన సిబ్బందులు కనబడుతుంటే వెంటనే డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి.

నిల్వ మరియు నిర్వహణ: దిన్ను ఆహారపదార్థాలు నిల్వచేసేచోట నిల్వచేయకండి. ఆలాగే దిని వెంట కలుషితమైన పిడిపులాలో పిడిపిన తినడం, త్రాగడం లేదా పాడ్రాణులందాంచే సమయ పేయడం. ఈ కీటకానికి వాటియొక్క బహిరంగ డబ్బాలలోనే నిల్వచేసి వుంచాలి. డబ్బాల మూతగట్టిగా బిగించి ఉంచి, మంచి గట్టి కప్పులలో, చల్లగా, పాడిగాప్పు, జాగా లాంటి పొలుతుగు ప్రదేశంలో నిల్వచేయాలి. ఇలా నిల్వ చేయడం వల్లా పిడి ఆరిపి వెంట పిడిపిలు కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ఈ కీటకానికిగల డబ్బాలను వాటి యొక్క పరిధిలను మరియు నెర్జాప్పట్టి కేటగిరి అమలులలో పెట్టి తాలు మీద పిగిపింది. అంతేకాక దిని ఆహారపదార్థాలు, పశువులలాగా, ఇతర కీటకాశాలు మరియు పెట్టెలన్నిటు దూరంగా నిల్వ చేయాలి.

భూమి దున్నుట పాలనియు విధానము: భూమి దున్నుటను తిరిగి ఏ విధంగానూ వాడాలు. భూమి దున్నుట పరులకోట్టి మనమ్మ సంవాహాలకి దూరంగా 1/2 మీటరు లోతులో గొయ్యి తవ్వి పాతిపెట్టి, దిన్ను లెవ్వ చేయడం లేదా పాడియాలు దాన్ని పరిపాలు, దిన్ను పిడి పరిచలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవాలి. దిన్ను చెరువులో, నదులో లేదా వాగులో ఇలాంటి కాలువలో పారలాదన్నే పరిచలాదు.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ	% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಕ್ಲೊರಾಂಥ್ರನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಸಂ:	18.5 %
ಮಿಥೈಲ್ ಮಿಥಾ ಫ್ರೈಲ್ ಎಥೈಲ್‌ಲಿಥಿಕ್ :	3.0
ಗ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಪಾಲಿಮರ್ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಪೈಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಪಾಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ಎಥೋಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೂತ್ರ	2.0
ಸೋಡಿಯಮ್	0.25
ಸಿಲಿಕಾ	0.1
ಸಿಲಿಕೋನ್ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ	0.5
ಪ್ರೊಪಾಯಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲಾಗಿ	6.8
ಕುಡಿಯಲಿ	ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆಂದು
ಒಟ್ಟಾದ	100

ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ: ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೇರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ: ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೇರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉಸಿರಾಟ: ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿರಿ. ಇಂಜೆಸ್ಟ್: ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇರಳ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ. ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇಂಹೇಲ್: ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿರಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ: ವಿಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು.

ಮುಕ್ತ ಉಪಯೋಗ: ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಕರಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. ಭೂಮಿ ಮರುಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಸಂಪರ್ಕ: ನಾಟ್‌ಕೊ ಫಾರ್ಮಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಾಟ್‌ಕೊ ಭವನ್, ಕೋಟಿ ನಂ. 2, ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್-500 034, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಇಂಡಿಯಾ.