NATMATE PBW
Gossyplure 4% RTU

Directions for use: This product is a pheromone based formulation containing straight chain lepidopteron pheromone used for the management of pink bollworm (*Pectinophora gossypiella*) in cotton. Applied as small dollops (~250 mg) on branch axils preferably 6 inches below the crop canopy.

Recommendations:

Crop	Common name of Pest	Dosage/acre A.I. (g)	Dosage/acre Formulation (g)	Dilution in water (litre)	PHI (Days)	Re-entry
Cotton	Pink Bollworm	5 per appln	125 per appln	As this is ready to use paste formulation, this should not be diluted with water	2 Days	24 Hrs

Weather conditions: Apply during non-rainy day. Allow 4-5 hours for drying.
Manner of Application: Manual Application as equally spaced 400-500 dollops per application per acre in a zig-zag pattern.
Time of Application:
First application: 30 days after sowing.
Second application: 60-65 days after sowing.
Third application: 90-95 days after sowing.
Fourth application: Need based application at 120-125 days after sowing.
Instructions for mixing: Ready to use product. No mixing required
Safety precautions:
1. Avoid inhalation and skin contact while handling/application. 2. The user should use gloves, mask and protective clothing while handling. 3. Wash hands thoroughly with soap and water after handling. 4. Remove contaminated clothing and wash before reuse. **Symptoms of Poisoning:** No known symptoms of poisoning for a specified use.
First Aid:
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Consult a physician, if necessary.
IF ON SKIN: Take off contaminated clothing. Wash skin immediately with soap and water, then rinse with plenty of water for 15-20 minutes. Consult a physician, if necessary.
IF SWALLOWED: Call physician, if necessary. Do not induce vomiting unless told to do so by physician. Do not give anything through mouth to an unconscious person.
Antidote: No specific antidote, treat symptomatically.
Storage: 1.The packages containing the insect pheromone formulation shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food materials or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insect pheromone formulation shall be well lit, well built, dry, cool, ventilated and of sufficient dimensions.
Disposal of container and surplus materials: 1. It shall be the duty of manufacturer, formulators and operators to dispose off the washings and surplus materials in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The package shall be broken and buried away from habitation.
Cautionary statement: 1. Not to be used for any purpose other than those mentioned on label/leaflet. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. Dangerous to Re-use empty containers.

Chemical Composition:		**%w/w**
(ZZ/ZE) 7, 11-Hexadecadienyl acetate	:	4 .00
Other ingredients	:	96.00
Total	:	**100.00**

नैटमेट पी बी डब्ल्यू
गॉसिपलुर ४ % आर टी यु

उपयोग के लिए निर्देश: यह उत्पाद एक फेरोमोन आधारित सूत्रीकरण है, इसमें सीधी श्रृंखला लेपिडोप्टेरान फेरोमोन है, जिसे कपास में गुलाबी इल्ली (पेक्टिनोफोरा गॉसिपीएला) के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शाखा कुल्हाड़ियों पर छोटे डोल्लोप्स (~२५० मिलीग्राम) के रूप में लगाया जाता है।
सुझाव:

फसल	कीट के नाम	प्रति एकड़ मात्रा स. तत्व (ग्राम)	प्रति एकड़ मात्रा संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम आवेदन तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनः प्रविष्टि:
कपास	कपास में गुलाबी इल्ली	५ /प्रयोग	१२५/प्रयोग	जैसे की ये एक उपयोग करने के लिए तैयार पेस्ट सूत्रीकरण है, इसे पानी के साथ नहीं मिलाना चाहिए।	२ दिन	२४ घंटे

मौसम की स्थिति: बारिश के दौरान उपयोग न करें। आवेदन के बाद ४–५ घंटे तक सूखने दें।
उपयोग की विधि: मैन्युअल अनुप्रयोग से समान रूप में ज़िग–ज़ैग पैटर्न में प्रति एकड़ 400–500 डॉलॉप्स प्रति आवेदन।
उपयोग का समय:
पहला आवेदन: बुवाई के 30 दिन बाद।
दूसरा आवेदन: बुवाई के 60–65 दिन बाद।
तीसरा आवेदन: बुवाई के 90–95 दिन बाद।
चौथा: ज़रूरत पड़ने पर बुवाई के 120–125 दिन बाद।
मिश्रण के लिए निर्देश: सूत्रीकरण सीधा उपयोग करने के लिए तैयार है। कोई मिश्रण की आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा पूर्वावधानियाँ: १. उपयोग करते समय साँस लेने से और त्वचा के संपर्क से बचें। २. उपयोगकर्ता को दस्ताने, मुखौटा और सुरक्षात्मक कपड़ो का उपयोग करना चाहिए। ३. उपयोग करने के बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोएं। ४. दूषित कपडें न पहने और दुबारा पहनने से पहले धो लें।
विष के लक्षण: किसी निर्दिष्ट उपयोग के लिए विषक्तता के कोई लक्षण नहीं हैं।
प्राथमिक उपचार: यदि आँखों में है: आँख खुली रखें और १५–२० मिनट तक पानी से धीरे–धीरे धोएं। यदि संपर्क लेंस पहना हो, उसे ५ मिनट के बाद निकालें फिर आंखें धोना जारी रखें। अगर जरुरत पड़े तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।
अगर त्वचा पर: दूषित कपड़ों को उतार दें। त्वचा को तुरंत साबुन और पानी से धोएं, फिर १५–२० मिनट तक खूब पानी से साफ करें। अगर जरुरत पड़े तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।
अगर निगल लिया हो: उपचार की सलाह के लिए चिकित्सक को बुलाएं। उलटी करने के लिए प्रेरित न करें जब तक चिकित्सक द्वारा ऐसा करने के लिए कहा न जाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दें।
प्रतिकारक कथन: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षण के अनुसार इलाज करें।
भंडारण: १. फेरोमोन आधारित सूत्रीकरण के डिब्बों/पैकेजस को अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जगहों, जिनमें अन्य वस्तुएं विशेषकर खाद्य सामग्री रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला–चाबी लगाकर रखें। २. जिस कमरे या अलमारी में फेरोमोन आधारित सूत्रीकरण का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए।
कंटेनर और अधिशेष सामग्री का निपटान: १. पर्यावरण और जल प्रदूषण को रोकने के लिए, फेरोमोन निर्माताओं, फ़ार्मुलेटर और ऍप्लिकेटर का कर्तव्य हैं की धोवन, मशीन पदर्त या अधिशेष सामग्री का निपटारा सुरक्षित तरीके से करें। २. उपयोग किये गए पैकजो/डिब्बों को पुनःउपयोग रोकने के लिए बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। ३. खाली डिब्बों को नष्ट करके निवास– स्थान से दूर गहरे मिट्टी में गाड़ देना चाहिए।
सावधानियाँ कथन: इस लेबल या पर्ची पर दिए गए उद्देश्यों के आलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद डिब्बों को नष्ट कर दें। खाली डिब्बों का दुबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है।

रासायनिक संरचना:		**% भार/भार**
(ZZ / ZE) 7,11– हेक्साडेकाडाईनैल एसीटेट	:	4.00
अन्य तत्व	:	96.00
कुल	:	**100.00**

નેટમેટ પીબીડબ્લ્યુ
ગોસીપ્લ્યૂર ૪% આર ટી યુ

વપરાશ સંબંધિત માર્ગદર્શનઃ આ ઉત્પાદન ફેરોમોન આધારિત સંયોજન છે જેમાં છે સ્ટ્રેઇટ ચેઇન લેપિડોપ્ટેરન ફેરોમોન કે જેનો ઉપયોગ કપાસમાંની જીંડવાની ગુલાબી ઇયળ(પેક્ટિનોફોરા ગોસીપીએલ્લા)ના વ્યવસ્થાપન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. આને પાકના છત્રની શક્ય હોય તો ૬ ઇંચ નીચેના કક્ષ પર નાનકડી લુગદી (~ ૨૫૦ મિગ્રા) તરીકે વાપરવામાં આવે છે.
ભલામણઃ

પાક	કીટકનું સામાન્ય નામ	માત્રા/એકર સ.ત. (ગ્રામ)	માત્રા/એકર સંયોજન (ગ્રામ)	પાણીનું પ્રમાણ (લીટર)	પીએચઆઇ (દિવસો)	પુનઃ પ્રવેશ
કપાસ	જીંડવાની ગુલાબી ઇયળ	૫/ ઉપયોગ	૧૨૫/ ઉપયોગ	આ વાપરવા માટે તૈયાર પૅસ્ટ હોવાથી આ પાણીમાં ભળવું ન જોઇએ	૨ દિવસો	૨૪ કલાક

હવામાનની પરિસ્થિતિઃ વરસાદ ના હોય એ દિવસોમાં વાપરો. ૪–૫ કલાક સૂકાવા દો.
વાપરવાનો સમયઃ હાથ વડે સમાન અંતરે ૪૦૦–૫૦૦ લુગદીઓ પ્રતિ ઍપ્લિકેશન પ્રતિ એકર સર્પાકારમાં લગાડો.
પ્રથમ ઉપયોગઃ વાવણીના ૩૦ દિવસો પછી.
બીજો ઉપયોગઃ વાવણીના ૬૦–૬૫ દિવસો પછી.
ત્રીજો ઉપયોગઃ વાવણીના ૯૦–૯૫ દિવસો પછી.
ચોથો ઉપયોગઃ જરૂર હોય એના આધારે વાવણીના ૧૨૦–૧૨૫ દિવસો પછી.
ભેળવવા માટેની સૂચનાઓઃ વાપરવા માટેનું તૈયાર ઉત્પાદન છે. ભેળવવાની જરૂર નથી.
સુરક્ષા માટેની સાવધાનીઓઃ ૧. વાપરતી વખતે શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો, ત્વચાને ના અડે એની કાળજી રાખો. ૨. વાપરતી વખતે વપરાશકર્તાએ હાથમોજાં, બુકાની અને સુરક્ષા આપતાં કપડાં પહેરવાં. ૩. કામ પતી ગયા પછી હાથને સાબુ અને પાણી વડે ધોઇ નાંખો. ૪. દુષિત કપડાંને કાઢી નાંખો અને ફરી વાપરો એ પહેલાં ધોઇ નાંખો.
ઝેર ચઢ્યાનાં લક્ષણોઃ ચોક્કસ વપરાશ માટે ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણો જાણમાં નથી.
પ્રાથમિક ઉપચારઃ
જો આંખમાં જાય તોઃ આંખોને પહોળી કરીને ધીમે અને હળવેથી ૧૫–૨૦ મિનિટ સુધી પાણીની છાલક મારીને ધૂઓ. જો હોય તો પ્રથમ પાંચ મિનિટ પછી કૉન્ટેક્ટ લૅન્સીસ કાઢી નાંખો અને ત્યાર પછી છાલક મારવાનું ચાલુ રાખો. જો જરૂરી લાગે તો ડૉક્ટરની સલાહ લો.
જો ત્વચા પર લાગે તોઃ દુષિત કપડાં કાઢી નાંખો. તરત જ સાબુ અને પાણી વડે ત્વચાને ધોઇ નાંખો, ત્યાર પછી ૧૫–૨૦ મિનિટ સુધી પુષ્કળ પાણી વડે એને ધૂઓ. જરૂરી લાગે તો ડૉક્ટરને બોલાવો.
જો પેટમાં જાય તોઃ જો જરૂરી લાગે તો ડૉક્ટરને બોલાવો. ડૉક્ટરના કહ્યા વગર ઊલટી કરાવશો નહીં. જો બેભાન હોય તો દરદીને મોં વાટે કદાપિ કંઇ પણ ના આપશો.
ઝેરનું મારણઃ ઝેરનું કોઇ ચોક્કસ મારણ જાણમાં નથી. લક્ષણો અનુસાર ઉપચાર કરો.
સંગ્રહઃ ૧. કીટક ફેરોમોન સંયોજન ધરાવતાં પૅકેજોને અલગ જ ઓરડા અથવા જગ્યામાં, અન્ય ચીજવસ્તુઓ રાખવાની જગ્યાથી, ખાસ કરીને ખાદ્યપદાર્થો રાખવાની જગ્યાથી દૂર અલગ જ કબાટમાં તાળું લગાવીને રાખો. ૨. કીટક ફેરોમોન સંયોજન ધરાવતાં પૅકેજોને સંગ્રહવાનો ઓરડો મજબૂત, સૂકો હવાઉજાસવાળો અને પૂરતો મોકળો હોવો જોઇએ.
પાત્રોનો અને વધેલા મટીરિયલનો નિકાલઃ ૧. ઉત્પાદકો, સંયોજકો અને સંચાલકોની એ ફરજ હશે કે પૅકેજો અથવા વધેલા મટીરિયલ અને ધોવાણનો નિકાલ એવી સલામત રીતે કરો કે જેથી પર્યાવરણ અને પાણી પ્રદુષિત ના થાય. ૨. વપરાયેલા પૅકેજોને તેનો ફરીથી ઉપયોગ ના થાય તે માટે બહાર છોડશો નહીં. ૩.પત્રિકામાં જણાવ્યા અનુસાર પૅકેજોને તોડી નાંખીને એનો નિકાલ કરો.
સાવચેતીરૂપ નિવેદનઃ ૧. પત્રિકા/પુસ્તિકા પર જણાવેલા હેતુને છોડીને અન્ય હેતુ માટે વાપરશો નહીં. ૨. પત્રિકા જણાવ્યા અનુસાર પાત્રોનો નાશ કરો. ૩. ખાલી પાત્રોનો ફરીથી ઉપયોગ કરવો ખતરનાક છે.

ઘટકોની સંરચનાઃ		**% વ/વ**
(ઝેડઝેડ/ઝેડઈ) ૭, ૧૧– હેક્ઝાડેકાડાયઇનાઇલ એસિટેટ	:	૪.૦૦
અન્ય તત્વ	:	૯૬.૦૦
કુલ	:	**૧૦૦.૦૦**

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE
उपयोग से पहले सूचना पत्रिका पढ़ें
FOR AGRICULTURAL USE ONLY.

Gossyplure 4% RTU

NATMATE® PBW

गॉसिपलुर ४% आर टी यु

नैटमेट® पी बी डब्ल्यू

NATCO Crop Health Sciences

Marketed by: NATCO Pharma Limited
Natco House, Road No. 2, Banjara Hills
Hyderabad-500 034, Telangana, India.
Manufactured by: ATGC Biotech Pvt. Ltd.
Factory: Sy. No.: 494, 495, 496, 500, Kolthur (V),
Shamirpet (M)-500 078, Telangana, India.

विक्रेता: नैटको फार्मा लिमिटेड
नैटको हाउस, रोड नंबर २, बंजारा हिल्स,
हैदराबाद–५०० ०३४, तेलंगाना, भारत।
निर्माता: एटीजीसी बायोटेक प्रा. लि.
फ़ैक्ट्री: सर्वे नं.: ४९४, ४९५, ४९६, ५००, कोल्टूर (ग्रा),
शमीरपेट (मं)–५०० ०७८, तेलंगाना, भारत।

విక్రేత: నాట్కో ఫార్మా లిమిటెడ్
నాట్కో హౌస్, రోడ్డు నం. 2, బంజారా హిల్స్,
హైదరాబాద్–500 034, తెలంగాణ, ఇండియా.
తయారుచేసినవారు : ఎటిజిసి బయోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
ఫ్యాక్టరి: సర్వే. నం. 494, 495, 496, 500 కొల్తూర్ (గ్రా),
శామీర్ పేట్ (మం.)–500 078, తెలంగాణ, ఇండియా.

Customer Care: Tel.: 040 23546564 / 23600836
Email: crophealth_support@natcopharma.co.in

KEEP IN COOL, DRY PLACE
AWAY FROM HEAT AND OPEN FLAME
® Registered Trade Mark
6220002

ನ್ಯಾಟ್‌ಮೇಟ್ ಪಿಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಗಾಸಿಪ್ಲೂರ್ 4% ಆರ್‌ಟಿಯು

ಬಳಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು: ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಫೆರೊಮೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿಕೊರಕ (ಪೆಕ್ಟಿನೊಫೊರಾ ಗಾಸಿಪೆಲಾ) ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ನೇರ ಸರಣಿಯ ಲಪಿಡೊಪ್ಟೆರಾನ್ ಫೆರೊಮೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಕೆನೊಪಿ ಕೆಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6 ಇಂಚುಗಳವರೆಗೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಡಾಲಪ್ಸ್‌ನಂತೆ (250 ಮಿಗ್ರಾಂ) ಹಾಕಬೇಕು.
ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಎಕರೆ ಎ.ಐ (ಗ್ರಾಂ)	ಡೋಸೇಜ್/ಎಕರೆ ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಂ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	ಕೊಯ್ಲುವಿನ ಅಂತರ (ದಿನಗಳು)	ಮರು-ಪ್ರವೇಶ
ಹತ್ತಿ	ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿಕೊರಕ	5/ ಅಳವಡಿಕೆ	125/ ಅಳವಡಿಕೆ	ಇದು ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿ- ಇದನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬಾರದು	2 ದಿನಗಳು	24 ಗಂಟೆಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಮಳೆಗಾಲವಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಣಗಲು 4–5 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕು.
ಅಳವಡಿಸುವ ಸಮಯ: ಅಂಕು ಡೊಂಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಎಕರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 400–500 ಡಾಲಪ್‌ಗಳಂತೆ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಅಳವಡಿಕೆ.
ಮೊದಲ ಬಳಕೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನಗಳು ನಂತರ.
ಎರಡನೆಯ ಬಳಕೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 60–65 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ.
ಮೂರನೆಯ ಬಳಕೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 90–95 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ.
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಳಕೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 120–125 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಬಳಕೆ.
ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಗಳು: ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ. ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವ ಅಡಿತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಬಳಸುವಾಗ ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. 2. ಬಳಕೆದಾರರು ಗ್ಲವ್ಸ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. 3. ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 4. ಮರುಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು, ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿಷಯುಕ್ತತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆಗೆ ವಿಷಯುಕ್ತತೆಯ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:
ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದರೆ: ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 15–20 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೆಲುವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ, ಮೊದಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಕಣ್ಣು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ: ಕಲುಷಿತವಾದ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ 15–20 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ನುಂಗಿದರೆ: ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವವರೆಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ.
ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.
ಸಂಗ್ರಹ: 1. ಕೀಟಗಳ ಫೆರೊಮೋನ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. 2. ಕ್ರಿಮಿಗಳ ಫೆರೊಮೋನ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬರುವಂತಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಒಣಗಿದಂತೆ,ತಂಪಾಗಿ, ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು.
ಕಂಟೈನರ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ:
1.ತಯಾರಕರು, ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ನೀರಿ ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹೊರಗಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಒಡೆದು, ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರ ಹೂಳಬೇಕು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿವರಣೆ: **1. ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. 2. ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. 3. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮರು-ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.**

ಸೂತ್ರೀಕರಣದ ಸಂರಚನೆ :		**% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು**
(ಜೆಡ್ ಜೆಡ್/ಜೆಡ್ ಇ) 7, 11– ಹೆಕ್ಸಾಡೆಕೆಡಿನಿಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್	:	4.00
ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು	:	96.00
ಒಟ್ಟು	:	100.00

నాట్‌మేట్ పి బి డబ్ల్యు
గాసిపిల్యూర్ 4% ఆర్ టి యు

ఉపయోగించుటకు ఆదేశం: ఇది ఫిరమోన్ ఆధారిత సూత్రీకరణ యొక్క ఉత్పాదన. ప్రత్తిలో గులాబిరంగు పురుగు నియంత్రణకు దీనిలో స్ట్రెయిట్ చైన్ లెపిడోప్టెరాన్ ఫిరమోన్ ఉంటుంది. ప్రత్తి మొక్క పై భాగం నుండి 6 ఇంచుల క్రింద కొమ్మ భాగం వద్ద చిన్న బిందువులుగా (డోలప్స్) (250 మి.గ్రా.) పెట్టాలి.
సిఫారసులు:

పంట	కీటక సామాన్య నామము	ప్రతి ఎకరాకు మోతాదు (గ్రాముల్లో) స.వ. (గ్రాముల్లో)	ప్రతి ఎకరాకు మోతాదు (గ్రాముల్లో) సూత్రీకరణ (గ్రాముల్లో)	కరిగించుటకు నీరు	చివరి వాడకం నుండి కోతకాలం వరకు వేచి ఉండాల్సిన సమయం (రోజుల్లో)	తిరిగి ప్రవేశం
ప్రత్తి	గులాబి రంగు పురుగు	5/అప్లికేషన్	125/అప్లికేషన్	వాడుటకు సిద్ధంగా ఉన్న పేస్ట్ కనుక నీటిలో కలపకూడదు.	2 రోజులు	24 గంటలు

వాతావరణ పరిస్థితులు: వర్ష సూచన లేని రోజున వాడండి. వాడిన తరువాత ఆరడానికి 4–5 గంటల సమయం పడుతుంది
వాడే పద్ధతి: ఒక ఎకరంలో మొక్కలపై 400–500 బిందువులను తికమక పద్ధతిలో పెట్టాలి.
వాడే సమయం:
మొదటిసారి : విత్తిన 30 రోజుల తరువాత.
రెండవసారి: విత్తిన 60–65 రోజుల తరువాత.
మూడవసారి: విత్తిన 90–95 రోజుల తరువాత.
నాలుగవసారి: అవసరాన్ని బట్టి విత్తిన 120 రోజుల తరువాత మళ్ళీ వాడండి.
మిశ్రమం తయారు చేయడానికి సూచనలు: వాడటానికి తయారుగా ఉన్న ఉత్పత్తి కావున ఏవీ కలపటం అవసరం లేదు.
ముందుజాగ్రత్తలు: 1. వాడేటప్పుడు ముక్కుద్వారా పీల్చకుండా మరియు చర్మానికి తగలకుండా జాగ్రత్తపడండి. 2. వినియోగదారుడు చేతి తొడుగులు, ముసుగు మరియు రక్షణ దుస్తులను ఉపయోగించాలి. 3. వాడిన తరువాత సబ్బు మరియు నీటితో చేతులను బాగా కడగాలి. 4. కలుషితమైన దుస్తులను తొలగించి, శుభ్రం చేసిన తరువాతనే మరల ఉపయోగించాలి.
విషలక్షణాలు: సిఫారసు చేయబడిన విధంగా వాడితే ఎలాంటి విషప్రభావం ఉండదు.
ప్రథమ చికిత్స:
కళ్ళకి తగిలితే: 1. కళ్ళు తెరచి ఉంచి 15–20 నిమిషాల సేపు నీటితో బాగా కడగండి. కాంటాక్ట్ లెన్స్ పెట్టుకున్నట్లైతే తీసేసి కళ్ళను 5 నిమిషాల సేపు బాగా కడగండి. 2. అవసరమైతే వైద్యుడ్ని సంప్రదించండి.
చర్మానికి తగిలితే: 1. మలినపడిన దుస్తుల్ని తీసివేయండి. 2. వెంటనే చర్మాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో 5–10 నిమిషాల సేపు బాగా కడగండి. 3. అవసరమైతే వైద్యుడ్ని సంప్రదించండి.
మింగినట్లైతే: 1. వైద్యుడ్ని సంప్రదించండి. 2. వైద్యుడు చెప్పనట్లైతే వాంతి చేయించకండి. 3. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి గుండా ఏమీ ఇవ్వవద్దు.
విరుగుడు: దీనికి నిర్దిష్ట విరుగుడు అంటూ ఏమీ లేదు. లక్షణాలకు అనుగుణంగా చికిత్స చేయండి.
నిల్వ: 1. ఇటువంటి ఫిరమోన్ సూత్రీకరణ కలిగి ఉన్న కంటెనర్లను, ఇతర వస్తువులకు, ముఖ్యంగా ఆహార వస్తువులను నిల్వ చేసే గదులకు దూరంగా, ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో పెట్టి తాళంవేసి బిగించి ఉంచాలి. 2. వీటిని నిల్వ చేసే గదులు గట్టి కట్టడముల్లై, విశాలంగా, పొడిగా, మంచి గాలి మరియు వెలుతురు ప్రసరించేలా ఉండాలి.
ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయు విధానం: 1. ఈ ప్యాకేజీలు మిగిలిపోయిన మందును మరియు పరికరాలు కడగగా వచ్చిన నీటిని సురక్షితమైన రీతిలో పారవేయాలి. వీటివలన పరిసరాలు లేదా నీరు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవాలి. 2. ప్యాకేజీలను తిరిగి ఏవిధంగానూ వాడరాదు కనుక వాటిని బయట వదిలి పెట్టరాదు. 3. ఖాళీ డబ్బాలను ధ్వంసం చేసి మనుష్య సంచారానికి దూరంగా పాతిపెట్టవలెను.
హెచ్చరిక: ఈ కరపత్రం/లేబుల్ పై సిఫారసు చేయబడిన పంటలకు తప్ప ఇతర పంటలకు ఉపయోగించరాదు. కరపత్రంపై నిర్దేశించిన విధంగా ఉపయోగించిన తర్వాత డబ్బాను నాశనం చేయండి. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం.

రసాయనిక మిశ్రమం:		**% బ/బ**
(ZZ/ZE) 7,11–హెక్సడేకాడినైల్ అసిటేట్	:	4.00
ఇతర పదార్థాలు	:	96.00
మొత్తం	:	100.00

Size : 120mm(L) x 130mm(H)

Size : 120mm(L) x 130mm(H)