Natvol™

Chlorantraniliprole 8.8 % + Thiamethoxam 17.5% SC

Insecticide

Chlorantraniliprole 8.8 % w/w + Thiamethoxam 17.5% w/w SC is a systemic insecticide recommended for its use as soil drench to control Leaf miner, Whitefly & Fruit borer in Tomato; Stem borer, Leaf folder, Green Leaf Hopper in Rice nursery; Early Shoot Borer, Top Shoot Borer, Termite, White grub in Sugarcane.

Chemical Composition	:	% w/w
Chlorantraniliprole a.i.	:	8.80
Thiamethoxam a.i.	:	17.50
Tristyrylphenol polyethoxyster phosphate	:	3.51
Sodium ligninsulfonate	:	0.88
Solution of an acrylic graft copolymer in water and propylene glycol	:	1.75
DL-propanediol-(1,2)	:	8.77
Polydimethylsiloxane	:	0.18
Magnesium aluminium silicate dispersion	:	3.07
Heteropolysaccharides	:	0.26
1,2-benzisothiazole-3-one	:	0.22
Potassium hydroxide	:	0.09
Sulfuric acid	:	0.09
Water	:	Q.S.
Total	:	**100.00**

Recommendation:

Crops	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Dosage/HA Formul-ations (ml)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Applicat-ion (In Hours)
Tomato	Leaf miner, Whitefly & Fruit borer	150 (Chlorantraniliprole 50+ Thiamethoxam 100)	500	50 -100 ml / plant	36	24 Hrs
Rice nursery	Stem borer, Leaf folder, Green Leaf Hopper	180 (Chlorantraniliprole 60+ Thiamethoxam 120)	600	100	116	
Sugarcane	Early Shoot Borer, Top Shoot Borer, Termite, White grub	180 (Chlorantraniliprole 60+ Thiamethoxam 120)	600	1000	298	

Precautions: During application wear hand gloves and face shield to avoid contact with the skin and prevent any splashes in to the eyes, wear protective clothing, mask goggles, and boots, while handling and application of the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Run off in to surface water to be avoided.

Toxic to Bees: Do not allow drift to flowering weeds, hedges or flowering crops in the vicinity of the treatment area. Do not spray on flowering crops between 15 days before start till end of flowering period. Do not spray during active bee-foraging period of the day and use with care to avoid air / dust contaminations of cropping area.

The product is toxic to aquatic organism.

Symptoms Of Poisoning: Nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal pain, dizziness, headache, mild sedation, eye irritation.

First Aid: 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. **2. If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing, consult a physician. **3. In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **4. In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Antidote: Preferably treat symptomatically. Take medical advice. Activated charcoal can also be administered. Use charcoal as slurry (240 ml water / 30 g charcoal). Dosages: 25 to 100 g for adults, 25 to 50 g for children (1 to 12 years) and 1 g for infants less than 1 year old.

Disposal Of Used Container 1. Packages or surplus materials and washings from machine and the containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environment and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Package shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The package containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for the storing insecticides shall be well built, dry, well lit, well ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour. 3. Keep away from direct sunlight and store in cool and dry place.

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label / leaflet.

Manufactured and Marketed by:

NATCO PHARMA LIMITED

Natco House, Road No 2, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana, India.

Factory: Plot No 3 & 8/1, Sy. No. 56 (P) & 60 (P), APIIC Industrial Park, Athivaram Village, Ozili Mandal, Sri Potti Sri Ramulu Nellore District - 524 421, Andhra Pradesh, India.

नैटवोल

क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 8.8 % भा /भा + थयामेथोक्साम 17.5 % भा /भा एस सी

कीटनाशक

क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 8.80 % भा /भा + थयामेथोक्साम 17.5 % भा /भा एस सी एक अन्तप्रवाही कीटनाशक है इसकी सिफारिश मिट्टी में ड्रेंचिंग के इस्तेमाल के लिए टमाटर की फसल पर लीफमैनेर (पर्णसुरिंगक), सफेद मक्खी तथा फल भेदक, धान की फसल पर तना छेदक, पत्ता मोडक, हरा फुदका और गन्ना की फसल पर कोमल तना धेदक, शीर्ष तना धेदक दीमक, व्हाइट ग्रब की रोकथाम के लिए सिफारिश की जाती है।

रासायनिक संरचना	:	% भार /भार
क्लोरेंट्रानिलिप्रोल स. त.	:	8.80
थयामेथोक्साम स. त.	:	17.50
ट्रीस्टाई रैलफिनॉल पॉली इथोक्सी स्टेर फॉस्फेट	:	3.51
सोडियम लिगनोसल्फोनेट	:	0.88
ऐक्रेलिक ग्राफ्ट कोपॉलिमर का घोल पानी व प्रोपैलीनग्लाइकोल	:	1.75
डी एल- प्रोपेनडिओल- (1,2)	:	8.77
पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन	:	0.18
मैग्नीशियम एल्युमीनियम सिलिकेट डिस्पेरशन	:	3.07
हेटेरो पॉली सककहराइड	:	0.26
1, 2-बेन्ज़ीसो थयझोले- 3- ओन	:	0.22
पोटैशियम हायड्रोक्साइड	:	0.09
सल्फ्यूरिक एसिड	:	0.09
पानी	:	पर्याप्त मात्रा
योग	:	**100.00%**

सिफारिश:

फसल (लें)	कीट का सामान्य नाम	मात्रा/ हे स. तत्व (ग्राम)	मात्रा/ हे संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)	पुन:प्रवेश प्रत्येक आवेदन के बाद (घंटों में)
टमाटर	पत्ता भेदक सफेद मक्खी, फल भेदक	150 (क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 50+ थयामेथोक्साम 100)	500	50-100 मिली/पौधा	36	24 घंटे
धान रोपण	तना छेदक, पत्ती मोड़क, हरा फुदका	180 (क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 60+ थयामेथोक्साम 120)	600	100	116	
गन्ना	कोमल तना धेदक शीर्ष तना धेदक दीमक, व्हाइट ग्रब	180 (क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 60+ थयामेथोक्साम 120)	600	1000	298	

सुरक्षा सवधानियाँ: इस्तेमाल करने के वक्त, त्वचा, आँख और मुँह को कीटनाशक के संपर्क से बचायें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे एप्रान, दस्तानों, नकाब और गम बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करें। कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना और पीना धूम्रपान नहीं करना चाहिए छिड़काव के बाद हाथों को साबुन से धोएं एवं प्रदूषित कपड़ो को तुरंत उतार दें। पानी एवं पानी के जलाशयों को कीटनाशक से दूषित होने से बचायें। दूषित कपडों को अच्छी तरह धो लें ।

मधुमक्खियों के लिए विषाक्त है ; कीटनाशक का छिड़काव इस प्रकार का करें जिस से छिड़काव की बूँदे अवशेष हवा द्वारा खरपतवारों में झाड़ियों की पुष्प अवस्था एवं फसलों की पुष्प आने की अवस्था में नहीं जाने पायें। फूलवाली फसलों में फूल आने के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद से फूल बनने की अवस्था पूरी होने तक स्प्रे नहीं करें। इस कीटनाशक को फसलों पर दिन में मधुमखियों के सक्रिय विचरण करने के समय इस्तेमाल नहीं करें और इस कीटनाशक का इस्तेमाल सावधानी से करें जिससे की हवा /धूल द्वारा फसल के क्षेत्र में इस कीटनाशक का फैलाव नहीं हो।

उत्पादन पानी के सूक्ष्मजीव के लिए विषाक्त है।

विषाक्तीकरण के लक्षण: मिचली, उल्टी, अतिसार, मांस पेशियों में दर्द, चक्कर आना, सरदर्द मानदशांति/ मुर्छितता एवं आँखों में जलन आदि हो सकते है।

प्राथमिक उपचार: 1. निगल जाने पर: यदि पीडित जागरूक एवं सक्रीय हो तो, मुँह को पानी द्वारा साफ करें एवं 1 या 2 गिलास पानी पिलायें। बेहोशी की अवस्था में मुँह द्वारा कुछ भी न दें। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उलटी करने की कोशिश न करें जब तक की डॉक्टर द्वारा आवश्यक न बताई जाये। **2. श्वास द्वारा अंदर जाने पर:** पीडित को खुली हवा में ले जाए एवं शरीर का तापमान नियंत्रण करें। यदि पीडित को श्वास लेने में परेशानी हो तो कृत्रिम श्वसन दें। मुँह द्वारा श्वसन कराये एवं डॉक्टर से संपर्क करें। **3. त्वचा के संपर्क में आने पर:** शरीर के संक्रमित भाग अंगुलियाँ, एवं नाखून को पानी एवं साबुन द्वारा साफ करें। यदि पीडित को दर्द, त्वचा पर लाल रेशें या बेचैनी महसूस हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। संक्रमित दूषित कपडो को अलग रखें एवं पुन: प्रयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करें। **4.आँखों के दूषित होने पर:** अत्यधिक पानी से 15 मिनट तक साफ करें, यदि आँखों में दर्द, लाल जलन एवं दृष्टिदोष महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

विषनाशक: मुख्य रूप से लक्षणाअनुसार इलाज करें। सक्रीय चारकोल का प्रयोग भी कर सकते है। चारकोल का घोल (240 मि ली पानी में 30 ग्राम चारकोल मिश्रण तैयार करें)। प्रयोग की मात्रा: 25-100 ग्राम वयस्क के लिए (1 से 12 वर्ष की आयु) एवं 9 ग्राम नवजात शिशु एवं 1 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

खाली डिब्बों का निपटारा: 1. पर्यावरण प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बों, बचा हुआ घोल पदार्थ मशीनों की धुलाई और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। 2. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजो को वैसे ही बाहर नहीं छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार उनके दुबारा उपयोग को रोका जा सकता है। 3. पैकेजो/डिब्बों को तोड-मोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्ते: 1. कीटनाशक के डिब्बों का अन्य सामग्री विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से ताला बंद अलमारियों में रखना चाहिए। 2. कीटनाशक के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारते मजबूत, सूखी प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वाष्प से प्रदुषण न हो सके। 3. सीधी धूप से अलग तथा ठण्डी व सुखी जगह पर रखें।

सावधानी: इस लेबल या पर्ची पर दिए गए उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए।

निर्माता और विक्रेता:

नैटको फार्मा लिमिटेड,

नैटको हाउस, रोड नंबर 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034, तेलंगाना, भारत।

फैक्ट्री: प्लॉट नं 3 और 8/1, सर्वे नं. 56 (पी) और 60 (पी), एपीआईआईसी इंडस्ट्रियल पार्क, अत्तिवरम ग्राम, ओज़िली मंडल, श्री पोट्टि श्री रामुलु नेल्लोर जिला-524 421, आंध्र प्रदेश, भारत।

नॅटवोल

क्लोराट्रानीलिप्रोल 8.8% डब्ल्यु/डब्ल्यु + थायमेथॉक्झाम 17.5% डब्ल्यु/डब्ल्यु एससी

किटकनाशक

क्लोराट्रानीलिप्रोल 8.8% डब्ल्यु/डब्ल्यु + थायमेथॉक्झाम 17.5% डब्ल्यु/डब्ल्यु एससी हे एक प्रणालीगत कार्य करणारे किटकनाशक असून टोमॅटो पिकावरील लीफ माइनर, पांढरी माशी आणि फळ पोखरणारा किडा, तांदूळ पिकावरील खोड पोखरणारा किडा, पाने दुमडणारी अळी, पानांवर उड्या मारणारा हिरवा किडा, ऊस पिकावरील लवकर येणारा शेंडेपोखर, वरचा शेंडेपोखर, वाळवी, हुमणी वर नियंत्रणासाठी जमीन भिजवण्याच्या रुपात वापरण्यासाठी त्याची शिफारस करण्यात येते.

रासायनिक संरचना	:	% भार/भार
क्लोराट्रानीलिप्रोल ए. आय.	:	8.80
थायमेथोक्झाम ए. आय.	:	17.50
ट्रायस्टेरीलफेनॉल पॉलिथॉक्सिएस्टर फॉस्फेट	:	3.51
सोडीयम लिग्नीसल्फोनेट	:	0.88
पाणीव प्रोपीललेनेग्लायकोलमध्ये एक्रिलिक ग्राफ्ट कोपॉलिमरचे द्रावण	:	1.75
अँटीफ्रीझ डीएल-प्रोपॅनेडिओल (1,2)	:	8.77
अँटीफोपिंग एजन्ट पॉलिडायमेथलसिलिन	:	0.18
मॅशियम एल्युमिनीयम सिलिकेट लिस्पर्शन	:	3.07
हेटेरोपॉलिसॅकराइडस	:	0.26
1,2 बेंझीसोथियाजोल-3-वन	:	0.22
पोटॅशियम हायड्रोक्साइड	:	0.09
सल्फ्युरिक एसिड	:	0.09
पाणी	:	पुरेशा प्रमाणात
एकूण	:	**100.00**

शिफारस:

पीक(के)	कीटकाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर स. घ. (ग्राम)	मात्रा/हेक्टर मिश्रण (मिली)	पाण्यात सौम्यीकरण (लीटर)	शेवटची फवारणी आणि कापणी दरम्यान वाट थांबण्याचा कालावधी (दिवस)	पुन्हा प्रवेश प्रत्येक फवारणीनंतर (तासात)
टोमॅटो	लीफ माइनर, पांढरी माशी आणि फळ पोखरणारा किडा	150 (क्लोराट्रानीलिप्रोल 50+ थायमेथॉक्झाम 100)	500	50-100 मिली/रोप	36	24 तास
तांदूळ रोप	खोड पोखरणारा किडा, पाने दुमडणारी अळी, पानांवर उड्या मारणारा हिरवा किडा	180 (क्लोराट्रानीलिप्रोल 60+ थायमेथॉक्झाम 120)	600	100	116	
ऊस	लवकर येणारा शेंडेपोखर, वरचा शेंडेपोखर, वाळवी, हुमणी	180 (क्लोराट्रानीलिप्रोल 60+ थायमेथॉक्झाम 120)	600	1000	298	

खबरदारी: पावडर भिरकावताना हातमोजे घाला व तोंडावर रुमाल बाँदा म्हणजे अंगावरपडणार नाही तसेच डोळ्यांत जाणार नाही ह्याची काळजी घ्या. द्रावण हाताळताना हातमोजे, संरक्षक कपडे, गॉगल, बूट वापरा, द्रावण फवारताना खामे-पिणे किंवा धुम्रपान करू नका. काम झाल्यानंतर लगेचच कपडे बदला आणि साबण व पाण्याने आंघोळ करा. अंगारील दूषित कपडे धुवा, जमिनीखालील पाण्याच्या स्रोतात मिसळू देऊ नका.

माशांसाठी विषाक्त: माशी अंडी घालत असताना फवारू नका. फवारणी कराऱ्या शेतातील आजूबाजूच्या फूल येणाऱ्या तणावर, गवतावर किंवा फूल येणाऱ्या पिकावर किटकनाशकाचा फवार उडणार नाही ह्याची काळजी घ्या. फूल धरण्यास सुरवात होण्याच्या 5 दिवस अगोदर आणि 5 दिवस नंतर अशा कालावधीदरम्यान फूल येणाऱ्या पिकावर फवारा उडणार नाही ह्याची काळजी घ्या. दिवसभरात माशा अंडी घालत असताना हे किटकनाशक फवारू नका आणि पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात हवेद्वारे/पावडर उडून लागण होऊ नये ह्यासाठी काळजीपूर्वक वापरा. जलचर प्राण्यांसाठी हे किटकनाशक विषाक्त आहे.

झाल्याची लक्षणे: मळमळणे, उलटी, अतिसार, पोटात दुखणे, भोवळ येणे, डोके दुखणे हलक्या स्वरूपात पेंगुपळणे, डोळे चुरचुरणे.

प्रथमोपचार: 1. पोटात गेल्यास: ती व्यक्ति शुद्धीवर व सावध असल्यास पाण्याने चूळ भरण्यास सांगा व 1 किंवा ग्लास पाणी प्यायला द्या. शुद्धीवर नसलेल्या व्यक्तिला कधीही तोंडावाटे पिण्यासाठी देऊ का. डॉक्टरांकडे न्या. डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय ओकारी काढण्यास प्रवृत्त करू नका. **2. नाकाटे पोटात गेल्यास:** त्या व्यक्तिला मोकळ्या हवेत न्या व त्याचे अंग गार पडणार नाही याची काळजी घ्या. जर ती व्यक्ति श्वासोश्वास करत नसेल किंवा खूप त्रास होत अशल्यास शक्यतो तोंडावाटे श्वासोश्वास देऊन कृत्रिम श्वासोश्वास द्या. डॉक्टरांकडे न्या. **3. अंगावर पडल्यास:** भरपूर पाण्याने व साबणाने आंघोळ करा व नखात किटकनाशक शिल्लक राहणार नाही ह्याची काळजी घ्या. दुखत असेल, त्वचा लाल किंवा चुरचुरत असेल तर डॉक्टरांकडे न्या. अंगावरील दूषित कपडे पुन्हा वापरण्यापूर्वी चांगले धुऊन घ्या. **4.डोळ्यात गेल्यास:** 15 मिनिटे डोळ्यावर स्वच्छ पाण्याचे हबकारे मारा, तरी देखील डोळे लाल किंवा चुरचुरत असेल तर, उजेड सहन होत नसेल तर, डोळ्यांच्या डॉक्टरांकडे न्या.

प्रतीविष: शक्यतो लक्षणांनुसार उपचार करा. औषधयुक्त कोळसा देखील देऊ शकता. वापर कोळशाचे जाडसर द्रावण करा (240 मिली पाणी/30ग्रॅम कोळसा) डोसेज: मोठ्या माणसांना 25 ते 100 ग्रॅम, मुलांना (1 ते 12 वर्षांचे) 25 ते 50 ग्रॅम, आणि 1 वर्षाखालील मुलांना 1 ग्रॅम.

लक्ष केलेली किडीची प्रजात किंवा किटकनाशकाचा वापर, साठवणूक इत्यादी घटकामुळे पिकाचे नुकसान किंवा हानी झाल्यास उत्पादक त्याची जबाबदारी घेत नाही कारण हे घटक उत्पादकाच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत.

वापरलेल्या डब्याची विल्हेवाट: 1. वापरलेले पाकिडे, अतिरिक्त सामुग्री व मिशनमधील पदार्थांची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावावी जेणेकरून हवा व पाणी दूषित होणार नाही. 2. वापरलेले डबे बाहेर उघड्यावर फेकू नयेत कारण त्यांचा पुनर्वापर होण्याची शक्यता असते. 3. पाकिटे वापरल्यानंतर फोडून मानवी वस्तीपासून दूरवर जमिनीखाली गाडावेत.

साठवूण ठेवण्याविषयी: 1. हे किटकनाशक असलेले पाकिट त्याच्या मूळ खाक्यात विशेष करून खाद्यपदार्थ किंवा अन्य वस्तू ठेवण्यासाठी असलेल्या खोलीपासून लांब, एका वेगळ्या खोलीत किंवा इमारतीत आणि किटकनाशकाचे स्वरुप व प्रमाण यानुसार वेगळ्या कपाटात कुलुपबंद करून ठेवावे. 2. किटकनाशक ठेवण्यासाठी अशलेली खोली किंवा इमारत पक्क्या बांधकामाची, ओलावा नसलेली, भरपूर उजेड असलेली व वायुनिजन आणि ऐसपैस असावी, म्हणजे बाष्पीभवना हवा दूषित होणार नाही.

सावधगिरी: हे उत्पादन पत्रिकेवर सूचित केलेल्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापरले जाऊ नये.

उत्पादक आणि विपणनकर्ता:

नॅटको फार्मा लिमिटेड

नॅटको हाउस, रोड क्र. २, बंजारा हिल्स, हैद्राबाद- ५०० ०३४, तेलंगणा, भारत.

कारखाना: प्लॉट क्र. ३ व ८/१, सि. क्र. ५६ (पी), ६० (पी), एपीआयआयसी इंडस्ट्रियल पार्क, अत्तिवरम व्हिलेज, ओझिली मंडल, स्री पोट्टी स्री रामुलु नेल्लोर जिल्हा – ५२४ ४२१, आंध्रप्रदेश, भारत.

નેટવોલ

ક્લોયાન્ટ્રાનિલિપોલ 8.8% 1/1+થાઇમેથોકેઝામ 17.5 1/1 એસસી

જંતુનાશક

ક્લોયાન્ટ્રાનિલિપોલ 8.8% 1/1 + થાઇમેથોકેઝામ 17.5 1/1 એસસી એક આંતરપ્રવાહી જંતુનાશક છે, જેની ભલામણ ટામેટાંના પાકમાંની પાન વાળી નાંખતી ઇયળ, સફેદ માખી અને ફળ છેદક, ડાંગરના પાકમાંની ડખછેદક, પાન વાળી નાંખતી ઇયળ, લીલા તીતીઘોડા, શેરડીના પાકમાંની આગોતરી ગાભમારાની ઇયળો ટોચની ગાભમારાની ઇયળો ઉધઇ, સફેદ માંકડ જીવાતના નિયંત્રણ માટે માટી પાળવાના ઉપયોગ તરીકે કરવામાં આવે છે.

સંરચના	:	%વ/વ
ક્લોયાન્ટ્રાનિલિપોલ સ.પ્ર	:	8.80
થાઇમેથોક્ઝામ સ.પ્ર	:	17.50
ડિસ્પર્સીંગ એજન્ટ ટ્રાઇન્સ્ટાગરિલનોલ પૉલિઇયોક્સીઇન્ટર ફોસ્ફેટ	:	3.51
સોડિયમ લિગ્નિરાલ્ફોનેટ	:	0.88
એક્રિલિક ગ્રાફ્ટ કૉપૉલિમરનું પાણીમાં સૉલ્યુશન અને પ્રોપાઇલેનગ્લાયકોલ	:	1.75
ડીએલ-પ્રોપાનેડિયોલ (1,2)	:	8.77
એન્ટિફોમિંગ એજન્ટઃ પૉલિડાયમીથાઇલ સિલોઝેન	:	0.18
મૅગ્નેટિમ ઍલ્યુમિનિયમ સિલિકેટ ડિસ્પર્સન	:	3.07
ડીટરોપોલિસેકરાઇસ	:	0.26
1,2-બેન્ઝિસૌતાઇઝોલ-3-વન	:	0.22
પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ	:	0.09
સલ્ફ્યુરિક એસિડ	:	0.09
પાણી	:	પ.મા.
કુલ	:	100.00

ભલામણઃ

પાક(કો)	જીવાતોનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હૅક્ટર સ.પ. (ગ્રા)	માત્રા/હૅક્ટર સંયોજન (મિલી)	પાણીનુ પ્રમાણ (લીટર)	અંતિમ છંટકાવ અને લણણી વચ્ચેનો અંતરાળ (દિવસોમાં)	પુનઃ પ્રવેશ દરેક છંટકાવ પછી (કલાકોમાં)
ટામેટાં	પાન વાળી નાંખતી ઇયળ, સફેદ માખી અને ફળછેદક	150 (ક્લોયાન્ટ્રાનિલિપોલ 50+ થાઇમેથોકેઝામ 100)	500	50-100 મિલી/ઝાડ	36	24 કલાક
ડાંગર નર્સરી	ડખછેદક, પાન વાળી નાંખતી ઇયળ, લીલા તીતીઘોડા	180 (ક્લોયાન્ટ્રાનિલિપોલ 60+ થાઇમેથોકેઝામ 120)	600	100	116	
શેરડી	આગોતરી ગાભમારાની ઇયળો ટોચની ગાભમારાની ઇયળો ઉધઇ, સફેદ માંકડ	180 (ક્લોયાન્ટ્રાનિલિપોલ 60+ થાઇમેથોકેઝામ 120)	600	1000	298	

સાવચેતીઓઃ પાથરતી વખતે હાથમોજાં અને મુખવટો પહેરો જેથી ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળી શકાય અને આંખોમાં જતા ટાળો. ઉત્પાદન જાળવતી અને વાપરતી વખતે સંરક્ષાત્મક વસ્ત્રો, મુખવટો, ગોગલ્સ અને બૂટ પહેરો. ઉત્પાદન વાપરતી વખતે ખાશો, પીશો અથવા ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. કાર્ય પૂરું થઇ ગયા પછી હાથ સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ધોઇ નાંખા અને કપડાં બદલી લો. ઉપરાંત દુષિત કપડાં ધોઇ નાંખા. જમીનના જળસ્રોતોમાં વડી જતાં ટાળો.

મધમાખી માટે ઝેરીઃ મધમાખી સક્રિય હોય ત્યારે ઉપયોગ ના કરો. સારવાર આસપાસના વિસ્તારમાં આવતાં નિંદામણો, કાંઠાના અથવા ફૂલના પાકો પર છાંટા ના ઉડવા દો. ફૂલ આવતાં પાકો પર ફૂલ આવવાની શરૂઆત ના 5 દિવસોથી આવી જાય એ દરમિયાન ઉપયોગ ના કરશો.

સવારના સમયે મધમાખીઓ સક્રિય હોય ત્યારે છંટકાવ કરશો નહીં અને પાકના વિસ્તારમાં હવા/રજકણનું પ્રદુષણ થતું ટાળવા કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરો. આ ઉત્પાદન જળચર જીવા માટે વિષાક્ત છે.

ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણોઃ ઉબકા, ઊલટી, અતિસાર, પેટમાં દુઃખાવો, ચક્કર આવવા, માથું દુઃખવું, સહેજ ઘેનમાં રહેવું આંખમાં બળતરા થવી.

પ્રાથમિક સારવારઃ 1.જો ગળી જવાય તોઃ જો વ્યક્તિ સભાન અને સચેત હોય તો પાણીના કોગળા કરાવો અને પીવા માટે 1 અથવા 2 ગ્લાસ પાણી આપો. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય મોં વાટે કંઇ આપશો નહીં. ડૉક્ટરને બોલાવો. જો સારવાર કરનારા ચિકિત્સક દ્વારા જણાય એ સિવાય ઊલટી કરાવવા પ્રયત્ન ના કરશો. **2.જો ગળી જવાય તોઃ** દરદીને શુદ્ધ ખુલ્લી હવામાં લઇ જાઓ અને શરીરના તાપમાનની કાળજી રાખો. જો દરદી શ્વાસ ના લેતી હોય અથવા તકલીફ સાથે શ્વાસ લેતી હોય તો કૃત્રિમ શ્વસન કરાવો, ખાસ કરીને મોંથી મોં વાટેનું શ્વસન. ચિકિત્સકની સલાહ લો. **3. ત્વચા સાથે સંપર્ક થવા પરઃ** શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગ સહિત વાળ અને નખ નીચેના ભાગને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ધોઇ નાંખો. જો દુઃખાવો, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે તો ડૉક્ટરને દેખાડો. બધાં જ દુષિત કપડાં અલગ કરી દો અને ફરી ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સાબુ અને પાણીથી બરાબર ધોઇ નાંખો. **4. આંખમાં જાય તોઃ** પુષ્કળ સાફ પાણી સાથે ઓછામાં ઓછી 15 મિનિટ સુધી છાલક મારીને સાફ કરો. જો દુઃખાવો, બળતરા અને લાલાશ અથવા ફોટોફોબિઆ રહે તો આંખના નિષ્ણાત ડૉક્ટરને દેખાડો.

વિષનાશકઃ વધુ કરી લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો. એક્ટિવેટેડ ચારકોલ પણ આપી શકાય છે. ઉપયોગઃ ચારકોલ ઘટ્ટ દ્રાવણ તરીકે (240 મિલી પાણી)/30 ગ્રાક ચારકોલ). માત્રાઃ પુખ્ત લોકોમાં 25થી 100 ગ્રામ (1થી 12 વર્ષ) અને 1 વર્ષથી નાના બાળકોમાં 1 ગ્રામ.

ખાલી પાત્રોનો નિકાલઃ 1. પૅકેજીસ અને ખાલી પાત્રોનો નિકાલ તેમ જ મશીન અને કન્ટેનરોની સફાઇ પર્યાવરણ અને જળ પ્રદુષણ ટાળવા સુરક્ષિત રીતે કરવો જોઇએ. 2. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ ટાળવા તેને બહાર રખડતાં ના રાખવા જોઇએ. 3. ખાલી પાત્રોને તોડીને વસ્તી ધરાવતાં પ્રદેશથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવાં જોઇએ.

સંગ્રહઃ 1. જંતુનાશક ધરાવતાં પાત્રોને તેનાં મૂળ પાત્રોમાં અલગ ઓરડી અથવા જગ્યામાં અન્ય પદાર્થો, ખાસ કરીને ખાધપદાર્થો સંગ્રહ કરાતી ઓરડી અથવા જગ્યાથી દૂર સંગ્રહ કરવા જોઇએ અથવા અલગ કબાટમાં તાળુંચાવી મારીને સંગ્રહ કરવા જોઇએ. 2. જંતુનાશકના સંગ્રહ માટેની ઓરડી કે જગ્યા યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી સૂકી, યોગ્ય હવા-ઉજાસ ધરાવદી અને પૂરતા વિસ્તારવાળી હોવી જોઇએ જેથી વરાળનું પ્રદુષણ ટાળી શકાય.

સાવચેતીઃ આ લેબલ/પત્રિકા પર ઉલ્લેખિત સિવાયના અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવું નહીં.

ઉત્પાદક અને વેચાણકર્તા :

નેટકો ફાર્મા લિમિટેડ,

નાટકો હાઉસ, રોડ નં. ૨, બંજારા હિલ્સ , હૈદરાબાદ- ૫૦૦ ૦૩૪, તેલંગાણા, ભારત.

ફૅક્ટરીઃ પ્લોટ નં. ૩ અને ૮/૧, એસવાય. નં. ૫૬(પી), ૬૦(પી), એપીઆઇઆઇસી ઇન્ડસ્ટ્રિઅલ પાર્ક, અત્તિવરમ વિલેજ, ઓઝિલિ મંડલ, શ્રી પોટ્ટી શ્રી રામુલુ નેલ્લોર જિલ્લો – ૫૨૪ ૪૨૧, આન્ધ્ર પ્રદેશ, ભારત.

ਨਾਟਵੋਲ

ਕਲੋਰੈਂਟਾਨਿਲਿਟ੍ਰੋਲ 8.8% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ + ਥਿਆਮੈਥੋਕਸਮ 17.5% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ ਐੱਸਸੀ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਕਲੋਰੈਂਟਾਨਿਲਿਟ੍ਰੋਲ 8.8% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ + ਥਿਆਮੈਥੋਕਸਮ 17.5% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ ਐੱਸਸੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟਕ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਫਲ ਛੇਦਕ, ਝੋਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤਨਾ ਛੇਦਕ, ਪੱਤਾ ਛੇਦਕ, ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਫੁਦਕਾ, ਗੰਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰਾ ਟਹਿਣੀ ਛੇਦਕ, ਚੋਟੀ ਟਹਿਣੀ ਛੇਦਕ, ਦੀਮਕ, ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ।

ਸੰਰਚਨਾ	:	% ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ
ਕਲੋਰੈਂਟ੍ਰਾਨਿਲਿ ਏ.ਆਈ.	:	8.80
ਥਿਆਮੈਥੋਕਸਮ ਏ.ਆਈ.	:	17.50
ਸਟੀਰਾਇਲਫੇਨੋਲ ਪੋਲੀਇਥੋਕਸੀਇਸਟਰ ਫੋਸਫੇਟ	:	3.51
ਸੋਡਿਅਮ ਲਿਗਨਿਨਸਲਫਨੇਟ	:	0.88
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਕ੍ਰਿਲਿਕ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕੋਪੋਲਿਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਿਲੇਨਗਲਾਈਕੋਲ ਦਾ ਘੋਲ	:	1.75
ਡੀਐੱਲ-ਪ੍ਰੋਪੇਨਡਿਓਲ-(1,2)	:	8.77
ਪੋਲੀਡਿਮੋਥਾਇਲਸਿਲੋਕਸੇਨ	:	0.18
ਮੈਗਨਿਸਿਅਮ ਐਲਿਊਮਿਨਿਅਮ ਸਿਲਿਕੇਟ ਡਿਸਪਰਜਨ	:	3.07
ਹੇਟਰੋਪੋਲਿਸੈਕਰਾਇਡ	:	0.26
1, 2-ਬੰਚਿਸੋਥਿਆਜ਼ੋਲ-3-ਇੱਕ	:	0.22
ਪੋਟਾਸਿਅਮ ਹਾਇਡ੍ਰੋਕਸਾਇਡ	:	0.09
ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸੋਲਵੈਂਟ: ਪਾਣੀ	:	0.09
ਪਾਣੀ	:	Q.S.
ਕੁਲ	:	**100.00%**

ਸਿਫਾਰਿਸ:

ਫਸਲਾਂ	ਕੀਟ ਦਾ ਨਾਮ	ਡੋਜ਼/ਹੈਕੀਅਰ ਏ.ਐਲ. (ਗਰਾਮ)	ਡੋਜ਼/ਹੈਕੀਅਰ ਸੰਰਚਨਾ (ਐਮ.ਐਲ.)	ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ (ਲਿਟਰ)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ (ਦਿਨ)	ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਘੰਟੇ)
ਟਮਾਟਰ	ਪੱਤਾ ਲਪੇਟਕ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਫਲ ਛੇਦਕ	150 (ਕਲੋਰੈਂਟਾਨਿਲਿਟ੍ਰੋਲ 50 + ਥਿਆਮੈਥੋਕਸਮ 100)	500	50-100 ਮਿ.ਲੀ./ਪੌਦਾ	36	24 ਘੰਟੇ
ਝੋਨਾ	ਤਨਾ ਛੇਦਕ, ਪੱਤਾ ਛੇਦਕ, ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਫੁਦਕਾ	180 (ਕਲੋਰੈਂਟਾਨਿਲਿਟ੍ਰੋਲ 60 + ਥਿਆਮੈਥੋਕਸਮ 120)	600	100	116	
ਗੰਨਾ	ਅਗੇਤਰਾ ਟਹਿਣੀ ਛੇਦਕ, ਚੋਟੀ ਟਹਿਣੀ ਛੇਦਕ, ਦੀਮਕ, ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ	180 (ਕਲੋਰੈਂਟਾਨਿਲਿਟ੍ਰੋਲ 60 + ਥਿਆਮੈਥੋਕਸਮ 120)	600	1000	298	

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਚੇਹਰੇ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਅਕ ਕੱਪੜੇ, ਮੁਖੌਟਾ, ਦਸਤਾਨੇ, ਅਤੇ ਬੂਟ ਪਾਓ। ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਓ-ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪਿਓ। ਕੰਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ। ਦੂਸਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਵੋ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਹਰੀਲਾ: ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਸਕਿਅ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵੀਡ, ਮੁਸਤੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਫੁੱਲ ਉੱਗਣ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਅ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੇ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾ/ਧੂੜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ।

ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਹਰੀਲਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ:1. ਜੋ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ 1 ਤੋਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਜ਼ਰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤਕ ਉਲਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾਓ । **2. ਜੋ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;** ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸੁਆਸ ਦਿਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਹ ਦੇਣਾ। ਚਿਕਿਤਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। **3. ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ** ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਅਤੇ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀਪਣ ਜਾਂ ਸਾੜ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। **4. ਅੱਖ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ:** ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਸਾੜ, ਲਾਲੀਪਣ ਜਾਂ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਕਾਟ: ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਐਕਟਿਵੇਟਿਡ ਚਾਰਕੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ: ਚਾਰਕੋਲ ਸਲਰੀ ਜਿਵੇਂ (240 ਮਿ.ਲਿ. ਪਾਣੀ/30, ਚਾਰਕੋਲ) ਖੁਰਾਕ: ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 100 ਗ੍ਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ (1 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ) ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਗ੍ਰਾ ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ: 1. ਪੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3. ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਹਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਦਸਤ, ਢਿੱਡ ਪੀੜ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਪੀੜ, ਹਲਕੀ ਸੁਸਤੀ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾੜ।

ਭੰਡਾਰਨ: 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂ, ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਤ, ਸੁੱਕੇ, ਵਧੀਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪ ਦੇ ਦੂਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਲੇਬਲ/ਲੀਫਲੈਂਟ ਤੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ:

ਨੈਟਕੋ ਫਾਰਮਾ ਲਿਮਟਡ,

ਨੈਟਕੋ ਹਾਊਸ, ਸੜਕ ਨੰਬਰ 2, ਬੰਜਾਰਾ ਹਿੱਲਸ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ-500034, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਭਾਰਤ।

ਫੈਕਟ੍ਰੀ: ਪਲੋਟ ਨੰ. 3 ਅਤੇ 8/1, ਠੇ. ਨੰ. 56 (P) ਅਤੇ 60 (P), **APIIC** ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਪਾਰਕ, ਅੱਤੀਵਰਮ ਪਿੰਡ, ਓਜ਼ਿਲੀ ਮੰਡਲ, ਸ੍ਰੀ ਪੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੂਲੀ ਨੇਲੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-524 421, ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ।

নাটভোল

ক্লোরান্ট্রানাইলিপ্রোল 8.8% ডব্লিউ / ডব্লিউ + থিয়ামেথোক্স্যাম 17.5% ডব্লিউ / ডব্লিড এসসি

কীটনাশক

ক্লোরান্ট্রানাইলিপ্রোল 8.8% ডব্লিউ / ডব্লিউ + থিয়ামেথোক্স্যাম 17.5% ডব্লিউ / ডব্লিড এসসি হচ্ছে পদ্ধতিগত কীটনাশক, যা টমেটো গাছকে পাতায় ছিত্রকারী, সাদা মাছি এবং ফলে ছিদ্রকারী, ধানের গাছকে কান্ডে ছিত্রকারী, পাতা কোঁচকানো, সবজু পাতা ফড়িং, আখ গাছকে প্রারম্ভিক শুঁটি রক্ষক, শীর্ষ শুঁটি রক্ষক, উইপোকা, সাদা শূককীটনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মাটি ভেজানোর জন্য ব্যবহার করতে হয়।

গঠন	:	%ডব্লিউ / ডব্রিউ
ক্লোরান্ট্রানাইলিপ্রোল এ.আই	:	8.80
থিয়ামেথোক্স্যাম এ.আই	:	17.50
ট্রাইস্টাইরাইলফেনল পলিইথক্সিস্টার ফসফেট	:	3.51
সোডিয়াম লিগনোসালফোনেট	:	0.88
জলের সঙ্গে একটি অ্যাক্রাইলিক গ্রাফ্ট কোপলিমার-এর দ্রবণ বেং প্রোপাইলিনগ্লাকোল	:	1.75
DL-প্রোপেনেডায়ল - (1,3)	:	8.77
পলিডাইমিথাইল সালোক্সেন	:	0.18
ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ডিসপারসন	:	3.07
হেটোরোপলিস্যাক্কারাইডস	:	0.26
1, 2 বেঞ্জিসোথিয়াসোল-3-ওয়ান	:	0.22
পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড	:	0.09
সালফিউরিক অ্যাসিড	:	0.09
জল	:	Q.S.
মোট	:	**100.00**

সুপারিশ:

শস্য (গুলি)	কীটের সাধারণ নাম	মাত্রা / হেক্টর এ.আই. (গ্রাম)	মাত্রা / হেক্টর গঠন (মি.লি.)	জলে দ্রবণীয়তা (লিটার)	সর্বশেষ স্প্রে থেকে ফসল কাটার মধ্যবর্তী অপেক্ষার সময় (দিন)	প্রত্যেক প্রয়োগের পরে পুনর্প্রবেশ (ঘন্টার হিসাবে)
টমেটো	পাতায় ছিত্রকারী, সাদা মাছি এবং ফলে ছিদ্রকারী	150 (ক্লোরান্ট্রানাইলিপ্রোল 50+ থিয়ামেথোক্স্যাম 100)	500	50-100 মিলিলিটার / উদ্ভাদ	36	24 ঘন্টা
ধানের চারাতলা	কান্ডে ছিত্রকারী, পাতা কোঁচকানো, সবজু পাতা ফড়িং	180 (ক্লোরান্ট্রানাইলিপ্রোল 60+ থিয়ামেথোক্স্যাম 120)	600	100	116	
আখ	প্রারম্ভিক শুঁটি রক্ষক, শীর্ষ শুঁটি রক্ষক, উইপোকা, সাদা শূককীট	180 (ক্লোরান্ট্রানাইলিপ্রোল 60+ থিয়ামেথোক্স্যাম 120)	600	1000	298	

সাবধান ব্যবস্থা: ছড়ানোর সময়ে হাতে গ্লাভস পরে নেবেন এবং মুখ ঢেকে রাখবেন যাতে ত্বকের সংস্পর্শে না আসে এবং চোখে ছিটকে না পড়ে। প্রোডাক্টটি নাড়াচাড়া এবং প্রয়োগের সময় সুরক্ষিত জামাকাপড়, মাস্ক, কালো চশমা এবং বুট পরে নেবেন। প্রোডাক্টটি প্রয়োগ করার সময় খাদ্য গ্রহণ, জলপান এবং ধূমপান করবেন না। ছড়ানোর পরে হত সাবান এবং প্রচুর পরিমাণ জল দিয়ে ধুয়ে নেবেন এবং জামাকাপড় ছেড়ে ফেলবেন। দূষিত জামাকাপড় ধুয়ে ফেলবেন। ভূগর্ভের জলের সাথে যেন মিশতে না পারে।

মজুদকরণ: 1. যে প্যাকেজটিতে কীটনাশক পদার্থটি থাকে তা অরিজিনাল প্যাকেই যেন থাকে, অন্যান্য বস্তু বিশেষ করে খাবার জিনিষ যে ঘরে মজুদ থাকে সেই ঘর অথবা স্থান থেকে দূরে আলাদা ঘরে অথবা স্থানে রাখতে হবে অথবা আলাদা ঘরে আলমারীতে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে।

2. কীটনাশক পদার্থটির মজুদ করার ঘর অথবা স্থান যেন আলোকিত, মজবুত, শুকনো হাওয়াবহুল এবং যথেষ্ট বড় হয় যাতে ঘরের আর্দ্রতা কখনও দূষিত না হতে পারে।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: বমিভাব, বমি পাওয়া, পেট খারাপ, পেটে ব্যথা, মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, হাল্কা ঝিমোনোর ভাব, চোখ জ্বারা।

প্রাথমিক চিকিৎসা: 1. পাকস্থলীর সংস্পর্শে এলে যদি ব্যক্তি জ্ঞান না হারিয়ে থাকেন এবং সচেতন থাকেন তাহলে জল দিয়ে মুখ খুব ভালো করে কুলকুচি করান এবং 1-2 গ্লাস জল পান করান। অজ্ঞান ব্যক্তিকে মুখ দিয়ে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না। চিকিৎসককে ডাকুন। বমি করানোর চেষ্টা করবেন না যতক্ষণ না বলেন। **2. শ্বাসের সাথে শরীরের ভেতরে গেলে:** রোগীকে ঘোলা হাওয়ায় নিয়ে আসুন এবং শরীরের তাপমাত্রার ওপর নজর রাখুন। যদি রোগী শ্বাস না নিতে পারে অথবা শ্বাস নিতে কষ্ট হয় তাহলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মুখ দিয়ে শ্বাস দেবার চেষ্টা বাঞ্ছনীয় হবে। চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করুন। **3. ত্বকের সংস্পর্শে এলে** চুল এবং আঙুলের নখের ভেতরের অংশ সহ শরীরের দূষিত স্থানগুলি সাবান এবং প্রচুর পরিমাণ জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। যদি ব্যথা, লালভাব এবং জ্বালা অনেকক্ষণ ধরে থাকে তাহলে চিকিৎসককে ডাকুন। সমস্ত দূষিত জামাকাপড় আলাদা করে রাখুন এবং সাবান ও জল দিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে ফেলুন পুনরায় ব্যবহার করার আগে। **4. চোখের সংস্পর্শে এলে** প্রচুর পরিমাণ জল দিয়ে ধীরে ধীরে অন্তত 15 মিনিট ধরে চোখে জলের ঝাপটা দিন। যদি ব্যথা, লালভাব, জ্বালা এবং ফোটোফোবিয়া অনেকক্ষণ ধরে থাকে তাহলে চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করুন।

প্রতিষেধক: কোনো নির্দিষ্ট ওষুধ নেই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন। অ্যাক্টিভেটেড কাঠকয়লাও দেওয়া যেতে পারে। ব্যবহার কাঠকয়লার পাতলা জল (240 মিলি জল প্রতি 30 গ্রাম কাঠকয়লা) প্রয়োগমাত্রা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 25 থেকে 100 গ্রাম, বাচ্চাদের জন্য 25 থেকে 50 গ্রাম (1-12 বছর) এবং শিশুদের জন্য 1 গ্রাম 1 বছরের ছোটো বাচ্চাদের জন্য।

মৌমাছিদের জন্য ক্ষতিকারক: মৌমাছিরা যখন সক্রিয় ভাবে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় তখন স্প্রে করা বাঞ্ছনীয় নয়। স্প্রে করা জায়গার নিকটবর্তী এলাকাতে ফুল ধরা আগাছা, ঝোপ অথবা ফুল ফসলের ওপর যেন স্প্রে করা না হয়। গাছের ফুল ধারণের 5 দিন আগে এবং 5 দিন পরের সময়কালের মধ্যে গাছের ওপর স্প্রে করবেন না।

মৌমাছিদের জন্য বিপদজনক মৌমাছিরা যখন খাবারের সন্ধানে সক্রিয় ভাবে ঘোরা ফেরা করে তখন প্রয়োগ করবেন নায যে সব স্থানে প্রয়োগ করা হয় তার নিকটবর্তী জমিতে ফুল সমেত আগাছা, ঝোপ অথবা ফুল ধরা গাছে প্রয়োগ করবেন না। সাবধানতার সাথে ব্যবহার করবেন যাতে হাওয়া অথবা ধূলোর মাধ্যমে ফসলের খেত দূষিত না হয়।

জলজ জীবদের জন্য এটি বিষাক্ত।

ব্যবহৃত কন্টেইনারগুলি বিনষ্ট করার জন্য নির্দেশাবলী: 1. প্যাকেজ অথবা অতিরিক্ত বস্তু সামগ্রী এবং মেশিন বা পাত্র ধোয়ার জল সুরক্ষিত উপায়ে বিনাশ করুন যাতে বাতাবরণ এবং জল দূষিত না হয়। 2. ব্যবহৃত কন্টেইনারের পুনঃব্যবহার রোধ করতে বাইরে ফেলে রাখবেন না। 3. খালি পাত্রগুলি ভেঙে ফেলুন এবং জন বসতির থেকে দূরে মাটির নিচে পুতে ফেলুন।

সতর্কতাসূচক বিবৃতি: এই লেবেল / তথ্যপত্রে উল্লেখিত ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রস্তুতকর্তা এবং বিপণনকর্তা :

ন্যাটকো ফার্মা লিমিটেড

ন্যাটকো হাউস, রোড নং.2, বানজারা হিলস, হায়দ্রাবাদ-500034, তেলেঙ্গানা, ভারত।

কারখানা: প্লট নং.3 এবং 8/1, সিস্টেম নং. 56 (P) এবং 60 (P), APIIC ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, আত্তিভরম ভিলেজ, ওজিলি মন্ডল, শ্রী পট্টি শ্রীরামুলু নেল্লোর জেরা – 524 421, অন্ধ্রপ্রদেশ, ভারত।

Caution : Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

सावधानी: इस लेबल या पर्ची पर दिए गए फसलों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए।

Customer Care: Tel.: 040 23546564 / 23600836

Email: crophealth_support@natcopharma.co.in

TM: Trademark under registration

6220011

नैटवोल

क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 8.8 % +

थयामेथोक्साम 17.5 % एस सी

कीटनाशक

Direction of use

Read attached leaflet before use.

उपयोग के लिये निर्देश

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढें

NATCO CROP HEALTH SCIENCES

Natvol™

Chlorantraniliprole 8.8 % + Thiamethoxam 17.5% SC

INSECTICIDE

Manufactured and Marketed by:

NATCO Pharma Limited

Natco House, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana, India.

Factory: Plot No. 3 & 8/1, Sy. No. 56 (P) & 60 (P), APIIC Industrial Park, Athivaram Village, Ozili Mandal, Sri Potti Sriramulu Nellore District - 524 421, Andhra Pradesh, India.

निर्माता व विक्रेता:

नैटको फार्मा लिमिटेड

नैटको हाउस, रोड नंबर २, बंजारा हिल्स, हैदराबाद–५०० ०३४, तेलंगाना, भारत।

फैक्ट्री: प्लॉट नं ३ और ८/१, सर्वे नं. ५६ (पी) और ६० (पी), एपीआईआईसी इंडस्ट्रियल पार्क, अत्तिवरम ग्राम, ओजिली मंडल, श्री पोट्टि श्रीरामुलु नेल्लोर जिला–५२४ ४२१, आंध्र प्रदेश, भारत।

Caution : Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

सावधानी: इस लेबल या पर्ची पर दिए गए फसलों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए।

Customer Care: Tel.: 040 23546564 / 23600836
Email: crophealth_support@natcopharma.co.in

TM: Trademark under registration



6220011

नैटवोल

क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 8.8 % +
थयामेथोक्साम 17.5 % एस सी
कीटनाशक

Direction of use
Read attached leaflet before use.

उपयोग के लिये निर्देश
उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढें

NATCO
CROP HEALTH SCIENCES

Natvol™

Chlorantraniliprole 8.8 % +
Thiamethoxam 17.5% SC
INSECTICIDE

Manufactured and Marketed by:
NATCO Pharma Limited
Natco House, Road No. 2, Banjara Hills,
Hyderabad - 500 034, Telangana, India.
Factory: Plot No. 3 & 8/1,
Sy. No. 56 (P) & 60 (P),
APIIC Industrial Park, Athivaram Village,
Ozili Mandal, Sri Potti Sriramulu Nellore
District - 524 421, Andhra Pradesh, India.

निर्माता व विक्रेता:
नैटको फार्मा लिमिटेड
नैटको हाउस, रोड नंबर २, बंजारा हिल्स,
हैदराबाद–५०० ०३४, तेलंगाना, भारत।
फैक्ट्री: प्लॉट नं ३ और ८/१, सर्वे नं. ५६ (पी)
और ६० (पी), एपीआईआईसी इंडस्ट्रियल पार्क,
अत्तिवरम ग्राम, ओज़िली मंडल,
श्री पोट्टि श्रीरामुलु नेल्लोर ज़िला–५२४ ४२१,
आंध्र प्रदेश, भारत।

నాట్‌వోల్

క్లోరాంథ్రానిలిప్రోల్ 8.8% బ/బ + థయోమిథాగ్జమ్ 17.5% బ/బ ఎస్ సి కీటకనాశిని

క్లోరాంథ్రానిలిప్రోల్ 8.8% బ/బ + థయోమిథాగ్జమ్ 17.5% బ/బ ఎస్ సి అనేది టొమాటో పంటలో ఆకు తొలిచే పురుగు, తెల్ల దోమ మరియు కాయ తొలుచు పురుగు, వరి పంటలో కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకు ముడత, దీపపు పురుగులు, చెఱకులో మొదట్లో వచ్చే కాండం తొలుచు పురుగు, పైన వచ్చే పీక పురుగు, చెదలు, వేరు పురుగులను నియంత్రించేందుకు నేల తడుపుగా ఉపయోగించవల్సిందిగా సిఫారసు చేయబడుతున్న అంతర్వాహక కీటకనాశిని.

நேட்வால்

குளோரான்த்ரானிலிப்ரோல் 8.8% எ/எ + தையாமெதாக்சாம் 17.5% எ/எ எஸ்சி பூச்சிக்கொல்லி

குளோரான்த்ரானிலிப்ரோல் 8.8% எ/எ + தையாமெதாக்சாம் 17.5% எ/எ குதி என்பது ஊடுருவிச் செயல்புரியும் ஒரு பூச்சிக்கொல்லி. இது தக்காளிப் பயிரில் தோன்றும் இலைத் துளைப்பான், வெள்ளை ஈ மற்றும் பழத் துளைப்பான், நெற்பயிரில் இலை துளைப்பான், வெள்ளை ஈ மற்றும் பழம் துளைப்பான், கரும்பில் இளங்குருத்துப் புழு, மேல் தண்டு துளைப்பான், கரையான், வெள்ளை வேர்ப்புழுக்களைக் கட்டுப்படுத்த மண்ணில் நனைத்து தெளிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

ನ್ಯಾಟ್ವೋಲ್

ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 8.8% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು + ಥಿಯಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 17.5% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ ಕೀಟನಾಶಕ

ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 8.8% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು + ಥಿಯಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 17.5% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ ಎಂಬುದು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಎಲೆಸುರುಳಿ, ಬಿಳಿನೊಣ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಕೊರಕ, ಭತ್ತದ ಕಾಂಡಕೊರಕ, ಎಲೆಸುರುಳಿ,ಹಸಿರು ಸಸ್ಯ ಮಿಡತೆ, ಕಬ್ಬುದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಗುರುಕೊರಕ, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಚಿಗುರು ಕೊರಕ, ಗೆದ್ದಲು, ಊಜೆನೊಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ନାଭଟୋଲ୍

କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନାଇଲପ୍ରୋଲ୍ 8.8% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ + ଥମେଥୋକ୍ସାମ 17.5% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସସି କୀଟନାଶକ

କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନାଇଲପ୍ରୋଲ୍ 8.8% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ + ଥମେଥୋକ୍ସାମ 17.5% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସସି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ କୀଟନାଶକ ଯାହା ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ପତ୍ରବିନ୍ଧା, ଧଳା ମାଛି ଏବଂ ଫଳବିନ୍ଧା କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ସିକ୍ତକାରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ।

നാട്ട്‌വോൾ

ക്ലോറാൻട്രാനിലിപ്രോൾ 8.8% WW + തയാമെതോക്സാം 17.5% WW SC കീടനാശിനി

ക്ലോറാൻട്രാനിലിപ്രോൾ 0.5% WW + തയാമെതോക്സാം 17.5% WW SC സർവ്വാംഗീണ പ്രവർത്തനമുള്ള ഒരു കീടനാശിനി ആണ്. തക്കാളി കൃഷിയിലെ ഇലതുരപ്പൻ, വെള്ളീച്ച, കായ് തുരപ്പൻ, നെല്ല് കൃഷിയിലെ തണ്ട് തുരപ്പൻ, ഇലചുരുട്ടി, പുൽച്ചാടി, കരിമ്പിൻ കൂമ്പ് തുരപ്പൻ, മുകളിലെ മുളപ്പ് തുരപ്പൻ, ചിതൽ, വൈറ്റ് ഗ്രബ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് മണ്ണ് കുതിർക്കുവാൻ ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

নাটিভোল

ক্লোৰেন্ট্ৰনিলিপ্ৰল 8.8% ডব্লিউ / ডব্লিউ + থিয়ামেথক্সাম 17.5 ডব্লিউ / ডব্লিউ এচচি
কীটনাশক

ক্লোৰেন্ট্ৰনিলিপ্ৰল 8.8% ডব্লিউ / ডব্লিউ + থিয়ামেথক্সাম 17.5 ডব্লিউ / ডব্লিউ এচচি হৈছে সাশৰীৰ কীটনাশক যিটো বিলাহী খেতিত লিফ মাইনাৰ, বগা মাখি আৰু ফ্লুট ব'ৰাৰ, ৰাইচ খেতিত ষ্টিম ব'ৰাৰ, লিফ ফ'ল্ডাৰ, সেউজীয়া পাত হুপাৰ, কুঁহিয়াৰখেতিত আগতীয়া শ্বুট ব'ৰাৰ, শীৰ্ষ শ্বুট ব'ৰাৰ, উঁইপোক, বগা গ্ৰাব নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অনুমোদন কৰা হয় ।

গঠন	: % ডব্লিউ / ডব্লিউ
ক্লোৰেন্ট্ৰনিলিপ্ৰল সক্ৰিয় উপাদান	: 8.80
থিয়ামেথক্সাম সক্ৰিয় উপাদান	: 17.50
ট্ৰিষ্টাইৰাইলফেনল পলিথক্সয়েষ্টাৰ ফচফেট ছ'ডিয়াম লিগ্নিনচালফোনেট	: 3.51
সোডিয়াম লিগনিসালফোনেট	: 0.88
পানী আৰু প্ৰপিলিনগ্লাইকোলত এক্ৰিলিক গ্ৰাফফ্‌ট কপোলিমাৰৰ দ্ৰৱণ	: 1.75
ডিএল–প্ৰপনেডিঅল (1.2)	: 8.77
পলিডাইমিথাইলচিল'ক্সেন	: 0.18
মেগনেছিয়াম এলিউমিনিয়াম	: 3.07
চিলিকেট ডিস্পাৰ্টন	: 0.26
হেটেৰোপলিচেকেৰাইড্‌চ	: 0.22
প্ৰিজাৰ্ভেটিভ 1.2 –বেঞ্জিচ'থিযাজল–3– ওৱান	: 0.09
পটাছিয়াম হাইড্ৰ'ক্সাইড	: 0.09
চালফিউৰিক এচিড	: Q.S.
পানী	: 100.00

পৰামৰ্শ :

শস্য	কীট সাধাৰণ নাম	মাত্ৰা / হেক্টৰ সক্ৰিয় উপাদান (গ্ৰাম)	মাত্ৰা / হেক্টৰ ফৰ্মূলেশ্বন (মি.লি.)	পানীত তৰলীকৰণ (লিটাৰ)	শেষৰবাৰ শস্য কটা আৰু ছটিওৱাৰ অন্তৰালৰ অপেক্ষাৰ সময় (দিন)	প্ৰতিটো আবেদনৰ পিছত পুনৰ্প্ৰৱেশ (ঘন্টা)
বিলাহী	লিফ মাইনাৰ, বগা মাখি আৰু ফ্লুট ব'ৰাৰ	150 (ক্লোৰেন্ট্ৰনিলিপ্ৰল 50 + থিয়ামেথক্সাম 100)	500	50-100 এমএল/উদ্ভিদ	36	24 ঘন্টা
ৰাইচ নাৰ্চাৰী	ষ্টিম ব'ৰাৰ, লিফ ফ'ল্ডাৰ, সেউজীয়া পাতহুপাৰ	180 (ক্লোৰেন্ট্ৰনিলিপ্ৰল 60 + থিয়ামেথক্সাম 120)	600	100	116	
কুঁহিয়াৰ	আগতীয়া শ্বুট ব'ৰাৰ, শীৰ্ষ শ্বুট ব'ৰাৰ, উঁইপোক, বগা গ্ৰাব	180 (ক্লোৰেন্ট্ৰনিলিপ্ৰল 60 + থিয়ামেথক্সাম 120)	600	1000	298	

সতৰ্কতাসমূহ : ছালত যাতে নালাগে তাৰ বাবে হাত মোজা পিন্ধি লওক আৰু চকুত কুঁহুৰি কণা, ছিটিকি নপৰিবৰ বাবে মুখা পিন্ধি লওক । কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত সুৰক্ষামূলক পোছাক, মুখা, গগল্‌চ আৰু বুট জোতা পিন্ধি লওক । কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত কোনো বস্তু, পেয় পদাৰ্থ নাখাব, ধূমপান নকৰিব ।