NATGEN PRO™
CHLORANTRANILIPROLE 35% w/w WG
Broad Spectrum Insecticide

Chlorantraniliprole 35% w/w WG is an anthranilic diamide insecticide, recommended for managing lepidopteran pests of Okra and Tomato.

Recommendations :

Crop	Common name of Pests	Dosage/Hectare			Pre-harvest interval (Days)	Re-entry Period (Hours)
		A.I (g)	Formu-lation (g)	Dilution in water (ltr)		
Okra	Fruit borers (Helicoverpa armigera & Earias vittella)	25	71	500	5	24
Tomato	Fruit borer (Helicoverpa armigera)	30	86	500	3	

DIRECTIONS FOR USE/APPLICATION TECHNIQUE :

Weather condition in general : Avoid application during adverse weather conditions.

Time & Number of application, frequency including maximum no. of application and crop stage for application : The product is to be foliar applied. First application should be initiated at the onset of flowering when pest populations reaches ETL (Economic Threshold Level) followed by second application at 12-14 days interval and make no more than two applications per crop season.

Spray equipment and nozzle type : Use high volume spraying equipment, such as knapsack sprayer, foot sprayer fitted with hollow cone nozzle to ensure thorough and uniform coverage.

Instructions for mixing : Fill spray tank ¼ to ½ full of water. Add insecticide directly to the spray tank as per label rates and mix thoroughly, to fully disperse the insecticide. Do not store spray solution overnight in spray tank.

Soil and water : No specific soil and water management is required.

SAFETY PRECAUTIONS :

1. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while applying the product.
2. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves, mask, and covered shoes while handling the product.
3. Avoid spray drift onto your person by spraying with the direction of the wind.
4. Do not blow the spray nozzle with mouth, clean the blocked nozzle with thin stem or brush.
5. In case of any spillage on the body, wash exposed parts with soap and plenty of water.
6. Wash hands and unprotected parts of the body properly after handling and before eating, drinking or smoking. Remove and wash contaminated clothing separately after use.

STORAGE CONDITIONS :

1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, away from the reach of children and livestock, animal feed, or shall be kept in a separate almirah under lock and key.
2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions so as to avoid contamination with vapors of insecticide.

DISPOSAL OF USED CONTAINERS :

1. Dangerous to reuse empty containers. Container should be triple rinsed with water and rinsate should be poured to the spray mix.
2. Packages shall be broken and buried away from habitation.
3. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
4. It shall be the duty of manufactures, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

SYMPTOMS OF POISONING : May cause discharge from eyes, mouth and/or nose.

FIRST AID MEASURES :

1. **If ingested :** If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.
2. **If inhaled :** Take the person to fresh air and take care of body temperature. If the person is not breathing or breathing with difficulty, administer artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician.
3. **In case of skin contact :** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use.
4. **In case of eye contact :** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

ANTIDOTE : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

CAUTIONS STATEMENT :

1. Not to be used for any purpose other than specified on label/leaflet.
2. This product is toxic to silkworms. Do not allow drift to nearby mulberry plantations and silk worm culture facilities. Do not rotate mulberry plantations after crops where chlorantraniliprole based formulation was commonly used in foliar or soil applications.
3. Chlorantraniliprole based formulations should not be applied when bees are actively foraging.
4. The product is moderately toxic to fresh water fish, aquatic invertebrates and may be avoided near aquaculture.

CHEMICAL COMPOSITION :

Component	:	% w/w
Chlorantraniliprole a.i.	:	35.0
Sodium alkyl naphthalene sulfonate	:	0.5
Sodium lignosulfonate	:	3.0
Sodium lignosulfonate, sulfomethylated	:	6.0
Amorphous silica	:	0.5
Sucrose	:	1.0
Clay	:	8.0
Lactose monohydrate	:	Q.S.
Total	:	100.00

नैटजेन प्रो
क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ३५% भा/भा डब्ल्यू जी
बहुआयामी कीटनाशक

क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ३५% भा/भा डब्ल्यू जी एक ऐन्थ्रानिलिक डायामाइड कीटनाशक है, जिसकी सिफारिश भिंडी और टमाटर के लेपिडोप्टेरान कीटों के नियंत्रण के लिए की जाती है।

सिफारिशें :

फसल	कीट का सामान्य नाम	प्रति हेक्टर मात्रा			कटाई से पहले अंतराल (दिन)	पुनः प्रवेश अवधि
		स. तत्व (ग्रा.)	मिश्रण (ग्रा.)	पानी की मात्रा (ली.)		
भिंडी	फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मीजेरा और इयरियास विटेला)	२५	७१	५००	५	२४
टमाटर	फल छेदक (हेलीकोवर्पा आर्मीजेरा)	३०	८६	५००	३	

इस्तेमाल के लिए निर्देश/आवेदन की तकनीक :

मौसम की स्थिति : मौसम की प्रतिकूल स्थिति के दौरान प्रयोग से बचें।

आवेदन का समय और संख्या, आवेदन की आवृत्ति समेत अधिकतम संख्या और आवेदन के लिए फसल चरण : इस उत्पाद को पत्तियों पर छिड़काव करे। पहला आवेदन फूल आने की शुरूआत में शुरू किया जाना चाहिए जब कीटों की आबादी ईटीएल (आर्थिक हानि स्तर) तक पहुंच जाए उसके बाद दूसरा आवेदन १२-१४ दिनों के अंतराल पर और प्रति फसल सीज़न उत्पाद को दो बार से अधिक इस्तेमाल न करें।

छिड़काव उपकरण और नोजल के प्रकार : पूरी तरह से और एकसमान छिड़काव सुनिश्चित करने के लिए हाई वॉल्यूम वाले स्प्रे उपकरण इस्तेमाल करें, जैसे नैपसैक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर आदि जिसमें होलो कोन नोज़ल लगा हुआ होना चाहिए।

मिश्रण के लिए निर्देश : स्प्रे टैंक को १/४ से १/२ तक पानी से भरें। कीटनाशक को लेबल दरों के अनुसार सीधे स्प्रे टैंक में डालें और अच्छी तरह मिश्रित कर लें। स्प्रे मिश्रण के घोल को पूरी रात के लिए स्प्रे टैंक में संग्रह न करें।

मिट्टी और पानी : किसी विशेष मिट्टी और जल प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है।

सुरक्षा संबंधी सावधानियां :

१. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पिये, न धूम्रपान करें न ही पान चबाएं।
२. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय पूरे बांह की शर्ट, लंबी पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, मास्क और ढके हुए जूते पहनें।
३. हवा की दिशा में स्प्रे करते हुए खुद पर स्प्रे की मार से बचें।
४. स्प्रे नोजल को मुंह से न खोलें, अवरुद्ध नोजल को पतली सींक या ब्रश से साफ करें।
५. शरीर पर किसी भी रिसाव की स्थिति में, खुले हिस्सों को साबुन और काफी सारे पानी से धोएं।
६. हाथों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह धोएं। प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों को उतारकर धोएं।

भंडारण :

१. पैकेज जिसमें सामग्री रखी हुई हो, को अन्य सामानों से अलग कमरे या परिसर में, बच्चों व पशुओं की पहुंच से दूर, पशुओं के चारे से दूर, अलग अलमारी में ताला-चाबी लगाकर रखना चाहिए।
२. कीटनाशक भंडारण का कमरा या परिसर मज़बूती से बना, प्रकाश वाला, हवादार और लंबा-चौड़ा हो, ताकि इसकी वाष्प से संदूषण न फैले।

खाली डिब्बो का निपटारा :

१. खाली डिब्बों का दुबारा प्रयोग खतरनाक है। डिब्बो को तीन बार पानी से खंगाल जाना चाहिए और इस खंगाले गए पानी को छिड़काव के घोल में डाला जाना चाहिए।
२. खाली डिब्बों को तोड़कर निवास से दूर जमीन में गाड़ दें।
३. खाली डिब्बों को दुबारा इस्तेमाल के लिए बाहर खुला न छोड़ें।
४. यह कीटनाशक निर्माताओं तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों/पैकेजिस या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।

विषाक्तता के लक्षण : आँखों, मुँह और/या नाक से स्राव पैदा हो सकता है।

प्राथमिक उपचार :

१. **निगल लिए जाने पर :** यदि मरीज होश में और सचेत है तो मुँह को पानी के साथ कुल्ला करवाएं और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें। कभी भी किसी बेहोश व्यक्ति को मुँह के द्वारा कोई चीज न दें। चिकित्सक को बुलाएं। जब तक चिकित्सक द्वारा कहा न जाए, तब तक उल्टी करवाने की कोशिश न करें।
२. **सांस ले लेने पर :** व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति सांस न ले रहा हो या सांस लेने में परेशानी हो, तो मुंह से कृत्रिम श्वास दें। डॉक्टर की सलाह लें।
३. **त्वचा से संपर्क होने पर :** बालों और नाखूनों के नीचे के भाग सहित शरीर के प्रभावित अंगों को साबुन और खूब सारे पानी के साथ अच्छी तरह से धोएं। यदि दर्द, जलन या लालिमा बनी रहती है तो चिकित्सक से संपर्क करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग करें और इस्तेमाल से पहले साबुन एवं पानी के साथ अलग से अच्छी तरह धोएं।
४. **आँखों से संपर्क होने पर :** कम से कम १५ मिनट तक खूब सारे पानी के साथ कोमलतापूर्वक आँखों को धोयें। यदि दर्द, जलन, लालिमा या प्रकाशभीति बनी रहती है तो आँखों के विशेषज्ञ से संपर्क करें।

विषनाशक : कोई भी ज्ञान विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

सावधानियां :

१. लेबल/पुस्तिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए।
२. यह उत्पाद रेशम के कीड़ों के लिए विषाक्त है। मलबरी बागानों और रेशम कीड़ा पालन कि सुविधाएँ के पास बहाव न होने दे। फसलों के बाद मलबरी के बागानों को न लगाये जहां आमतौर पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल आधारित सूत्रीकरण का उपयोग पत्ते या मिट्टी में किया जाता हो।
३. क्लोरेंट्रानिलिप्रोल आधारित सूत्रीकरण का प्रयोग मधुमक्खियां सक्रिय होने पर न करें।
४. यह उत्पाद ताजे पानी मे रहने वाली मछली और अन्य रीढ़विहीन जीवों के लिए ममूली रूप से विषक्त है, इसलिए इसका प्रयोग जलीय कृषि के पास नहीं किया जाना चाहिए।

रासायनिक संरचना :

संघटक	:	% भा/भा
क्लोरेंट्रानिलिप्रोल स.त.	:	३५.०
सोडियम अल्काइल नफ्थेलीन सल्फोनेट	:	०.५
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	:	३.०
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट, सल्फोमिथाइलेटिड	:	६.०
अमोरफॉस सिलिका	:	०.५
सुक्रोस	:	१.०
क्ले	:	८.०
लैक्टोस मोनोहाईड्रेट	:	पर्याप्त मात्रा
कुल	:	१००.००

नॅटजेन प्रो
क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ३५% व / व डब्ल्यू जी
व्यापक प्रभावी कीटकनाशक

क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ३५% व/व डब्ल्यू जी एक ऐन्थ्रानिलिक डायामाइड कीटकनाशक आहे, ज्यायी शिफारस भेंडी आणि टोमॅटो चे लेपिडोप्टेरान कीटकांच्या नियंत्रणासाठी केली जाते.

शिफारस :

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	प्रमाण प्रति हेक्टर			शेवटची फवारणी ते कापणीतील वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवसात)	पुनः प्रवेश अवधि
		स. त. (ग्रॅ.)	द्रावण (ग्रॅ.)	सौम्य करण्यासाठी पाणी (ली.)		
भेंडी	फळ पोखरणारी (हेलीकोवर्पा आर्मीगेरा, इयरालियास विलिया)	२५	७१	५००	५	२४
टोमॅटो	फळ पोखरणारी अळी (हेलीकोवर्पा आर्मीगेरा)	३०	८६	५००	३	

वापरासाठी निर्देश / फवारणीची टेक्नीक :

हवामानाची सामान्य स्थिती : हवामानाच्या प्रतिकूल स्थितीच्या वेळी वापर करु नये.

फवारणीची वेळ आणि फवारणीची संख्या, फवारणीची वारंवारता अधिकतम संख्या आणि फवारणीसाठी पीकाचा टप्पा: ह्या उत्पादनाची पर्णिय फवारणी करावी. पहीली फवारणी फुले येण्याच्या सुरुवातीला सुरु केली पाहीजे जेव्हा कीटकांची संख्या ईटीएल (आर्थिक नुकसानीच्या स्तरा) पर्यंत पोहचले तेव्हा त्यानंतर दुसरी फवारणी १२-१४ दिवसांच्या अंतराने आणि प्रत्येक पीक सीजन उत्पादनाला दोन वेळे पेक्षा जास्त वापर करु नये.

फवारणी उपकरण आणि नोझलचे प्रकार : पूर्ण पणे आणि एकसमान फवारणी सुनिश्चित करण्यासाठी हाई वॉल्यूम वाल्या फवारणी उपकरणाचा वापर करा, जसे नॅपसॅक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर. इ. ज्यात हॉलो कोन नोझल लावलेले असावे.

मिश्रणासाठी निर्देश : फवारणी टाकीला १/४ ते १/२ पर्यंत पाण्याने भरा. कीटकनाशकाला लेबलच्या दरानुसार सरळ फवारणी टाकीत घाला आणि व्यवस्थित पणे मिश्रित करा. फवारणी मिश्रणाच्या. द्रावणाला पूर्ण रात्रभरासाठी फवारणी टाकीत साठवून ठेवू नये.

माती आणि पाणी : कोणत्याही खास माती आणि जल प्रबंधनाची आवश्यकता नाही.

सुरक्षेतते संबंधी खबरदारी :

१. उत्पादनाचा वापर करते वेळी काहीही खावू, पीवू व धुम्रपान करु नये, पान चघळू नये.
२. उत्पादनाचा वापर करते वेळी पूर्ण बाहीचा शर्ट, लांब पँट, रासायन प्रतिरोधक हातमोजे, मास्क आणि झाकलेले बूट वापरा.
३. हवेच्या दिशेने फवारणी करत फवारणीच्या तुषारां पासून स्वत:ला वाचवा.
४. फवारणी नोझलला तोंडाने फुंकू नये, अवरोधित नोझलला स्टेम वा ब्रश ने स्वच्छ करावे.
५. शरीरावर कोणत्याही गळतीच्या परिस्थितीत, उघड्या भागाला साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा.
६. हात आणि शरीराचा उघड्या भागाला व्यवस्थित धुवा. फवारणी नंतर दूषित कपडे काढून धुवा.

साठवण :

१. हे कीटकनाशक असणारी पॅकेजिस इतर माल ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा वा खोल्या या पासून दूर जागी वा खोल्यात किंवा कीटकनाशकांचा दर्जा व स्वरुप यांचा विचार करुन कपाटात कडीकुलपात ठेववावेत. २) हे कीटकनाशक साठा करुन ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेलती राहणारी, भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोठी असावी त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदषण टळेल.

विल्हेवाट :

१. रिकामी डब्यांचा पुर्नवापर धोकादायक आहे. डबे तीन वेळा पाण्याने खळखळून धुतले पाहीजेत आणि खळखळून धुवणाचे पाणी फवारणीच्या द्रावणात टाकले पाहीजे.
२. वापरलेली पॅकेजिस मोडून-तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावीत.
३. पुन: अन्य कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिस उघड्यावर टाकू नयेत.
४. कीटकनाशक निर्माता व उपयोगकर्ता ह्यांचे कर्तव्य आहे कि पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा फवारणीची उपकरणी धुतलेले पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने करावी.

विषबाधाची लक्षणे : डोळे, तोंड आणि/किंवा नाकातून स्राव होऊ शकतो.

प्रथमोपचार :

१. **जर गिळले गेल्यास :** व्यक्ती शुध्दीवर असेल तर, पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि १ किंवा २ ग्लास पाणी पिण्यास द्या . व्यक्ती जर बेशुध्द असेल तर तोंडाद्वारे काहीही देवू नये. डॉक्टरला बोलवा. जोपर्यंत उपस्थित चिकित्सका द्वारे उल्टी करण्यास सांगितले जात नाही तो पर्यंत उल्टी करु नये.
२. **जर श्वासद्वारे आत घेल्यास :** रूग्णास मोकळ्या हवेत आणा आणि शरीर तापमानावर लक्ष देवा. जर रूग्ण श्वास घेत नसेल वा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वसन द्या, शक्यतो तोंडाने। तोंडस श्वासोच्छ्वास द्या. चिकित्सकाचा सल्ला घ्या.
३. **जर त्वचेशी संपर्क आल्यास :** शरीराशी संपर्क आलेला भाग साबण व भरपूर पाण्याने धुवा, या सह केस व नखे देखील धुवा, जर वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहील्यास डॉक्टरचा सल्ला घ्या सर्व दुषित झालेले कपडे वेगवेगळे आणि वापर करण्यापूर्वी व्यवस्थित पणे साबण व पाण्याने वेगळे धुतले पाहिजेत.
४. **जर डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास :** तर डोळे भरपूर पाण्याने जवळ-जवळ १५ मिनिटे स्वच्छ धुवा, जर वेदना, जळजळ सहन होत नसेल लालसर पणा व प्रकाश अतिवेदन होत असेल तर नेत्र चिकित्सकाचा सल्ला घ्या.

औषधोपचार : कोणताही खास उपचार ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

खबरदारी :

१. लेबल/लिफलेट वर सांगितलेल्या शिवाय इतर कोणत्याही प्रयोजना साठी वापर करु नये.
२. हे उत्पादन रेशमाच्या किड्यांसाठी विषारी आहे. तुतीचे वृक्षारोपण आणि रेशमी कीटक पालनाच्या सुविधाजवळ वाहून जावू देवू नये. पीकां नंतर तूतीचे वृक्षारोपण करु नये, जेथे साधारणतः क्लोरेंट्रानिलिप्रोल आधारित सुत्रीकरणाचा उपयोग पाने वा मातीत केला जात असेल.
३. क्लोरेंट्रानिलिप्रोल आधारित सुत्रीकरणाचा वापर मधमाश्या सक्रिय असताना करु नये.
४. हे उत्पादन ताजा पाण्यात राहणारे मासे आणि इतर रोडविहीन जल जीवांसाठी कमी प्रमाण विषारी आहे, म्हणूनच ह्याचा वापर मत्स्य पालनाच्या बाजूला करु नये.

रासायनिक संरचना :

प्रमाण	:	% व/व
क्लोरेण्ट्रानिलिप्रोल स.त.	:	३५.०
सोडियम अल्केल नाप्थालेन सल्फोनेट	:	०.५
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	:	३.०
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट, सल्फोमिथाइलेटिड	:	६.०
अमोरफॉस सिलिका	:	०.५
सुक्रोस	:	१.०
क्ले	:	८.०
लॅक्टोस मोनोहाइड्रेट	:	क्यू.एस.
एकूण	:	१००.००

नेटजेन प्रो
क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल ३५% भार /भार डब्ल्युजी
बहुआयामी जंतुनाशक

क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल ३५% भार/भार डब्ल्युजी भींडी अने टमेटाना लेपिडोप्टेरन जंतुनी मावजत माटे भलामण करातुं अन्थ्रेनिलिक डायामाईड जंतुनाशक छे.

भलामणो :

पाक	कीटनुं सामान्य नाम	प्रति हेक्टर मात्रा			छंटकावथी लणणी सुधीना प्रतिक्षा समय	पुनः प्रवेश समय गाळो
		स.त. (ग्राम)	फॉर्म्युलेशन (ग्राम)	पाणीमां धोळ (लि.)		
भींडी	फळवेधक (हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा अने अर्तिझेस विलिइा)	२५	७१	५००	५	२४
टमाटर	फळ छेदक (हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा)	३०	८६	५००	३	

ઉપયોગની રીત / છંટકાવની પદ્ધતિ :

સામાન્ય રીતે હવામાનની સ્થિતિ : માઠી હવામાનની સ્થિતિ દરમિયાન છંટકાવ કરવાનું ટાળો.

છંટકાવનો સમય અને સંખ્યા, છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત સાતત્યતા અને છંટકાવ માટે પાકનો તબક્કો: ઉત્પાદન પાન પર છંટકાવ કરવા માટે છે. પ્રથમ છંટકાવ ફલ્લ બેસતાં જંતુની વસતિ આર્થિક નુકસાન કરે તે પૂર્વે કરવો જોઈએ અને તે પછી ૧૨-૧૪ દિવસના અંતરે બીજો છંટકાવ કરવો જોઈએ. પાકની મોસમ દીઠ બેથી વધુ છંટકાવ નહીં કરવા જોઈએ.

છંટકાવનું ઉપકરણ અને નોઝલનો પ્રકાર : સંપૂર્ણ અને એકસમાન આવરણની ખાતરી રાખવા માટે હાઈ વોલ્યુમ છંટકાવનું ઉપકરણ, જેમ કે, નેપસેક સ્પ્રેયર, પોલા કોન નોઝલ સાથે ફિટ કરેલું ફૂટ સ્પ્રેયર ઉપયોગ કરવા જોઈએ.

મિશ્રણ માટે સૂચના : પાથી અડધી ટાંકી પાણી સ્પ્રે ટેન્કમાં ભરો. લેબલ પર દર્શાવેલા પ્રમાણ અનુસાર ટાંકીમાં સીધું જંતુનાશક ઉમેરો અને જંતુનાશક સંપૂર્ણ ભળી જાય તેમાટે બરોબર મિશ્રણ કરો. ટાંકીમાં રાતભર મિશ્રણ સંગ્રહ નહીં કરી રાખવું.

માટી અને પાણી : કોઈ ચોક્કસ માટી અને પાણીની માવજત આવશ્યકતા નથી.

સુરક્ષાની સાવચેતીઓ :

૧. ઉત્પાદન છંટકાવ કરવા સમયે કશું ખાવું, પીવું, તમાકુ ચગળવું કે ધૂમ્રપાન નહીં કરવું જોઈએ.
૨. મિશ્રણ હાથ ધરતી વખતે લાંબી બાંયનું શર્ટ, લાંબું પેન્ટ, રસાયણ પ્રતિરોધક હાથમોજાં, માસ્ક અને આવરણવાળાં જૂતાં પહેરવાં.
૩. તમારા શરીર પર ધૂમ્ર ઊડે નહીં તે માટે પવનની વિરુદ્ધ દિશામાં છંટકાવ કરવો.
૪. સ્પ્રે નોઝલને મોઢાથી ફૂંકવું નહીં, પાતળા થડ અથવા બ્રશથી અવરોધાયેલું નોઝલ સાફ કરો.
૫. જો શરીર પર પડે તો સાબુ અને ભરપૂર પાણીથી સન્મુખ ભાગને ધોઈ નાખો.
૬. હાથ અને શરીરના અસુરક્ષિત ભાગોને હાથ ધર્યા પછી અને ખાવા– પીવા કે ધૂમ્રપાન કરવા પૂર્વે સાફ ધોઈ નાખવા જોઈએ. ઉપયોગ પછી દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો અને અલગથી ધોઈ નાખો.

સંગ્રહ :

૧. તુનાશકો ધરાવતાં પૅકેજીસ બીજી ચીજવસ્તુઓ સંગ્રહવા માટે વપરાતાં ઓરડા અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડા અથવા જગ્યામાં સંગ્રહવાં અથવા જંતુનાશકના જથ્થા અને પ્રકાર ઉપર આધાર રાખીને અલગ કબાટમાં તાળાંચાવીમાં બંધ કરીને રાખવાં.
૨. જંતુનાશકો સંગ્રહવા માટેનાં ઓરડા અથવા જગ્યા સારી પેઠે બાંધેલાં, સૂકાં, સારો પ્રકાશ ધરાવતાં, હવીદ અને પૂરતી મોકળાશ ધરાવતાં હોવાં. જોઈએ જેથી વરાળથી દુષિત થતું ટાળી શકાય.

નિકાસ :

૧. ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે. ડબ્બા પાણીમાં ત્રણ વાર બોળી જોઈએ અને તે પાણી છંટકાવના મિશ્રણમાં રેડી દેવું જોઈએ.
૨. પૅકેજીસ ભાંગી નાંખવા અને વસ્તીથી દૂર દાટીદેવા.
૩. વપરાયેલાં પૅકેજીસ બહાર રાખવાં નહીં જેથી તેમનો ફરી ઉપયોગ થતો અટકે.
૪. જંતુનાશકોના ઉત્પાદકો, તૈયાર કરનારાઓ તથા સંચાલકોની એ ફરજ રહેશે કે પૅકેજીસ અથવા વધારાની સામગ્રી અને ધોવારાણનો એની સલામત રીતમાં નિકાલ કરવામાં આવે જેથી પર્યાવરણનું અથવા જળ પ્રદુષણ થતું અટકાવી શકાય.

ઝેરનાં લક્ષણો : આંખ, મોઢું અને / અથવા નાકમાંથી પાણી આવી શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર :

૧. **જો ગળી જવાયું હોય તો :** વ્યક્તિ ભાનમાં હોય અને સતર્ક હોય તો, પાણી વડે મોઢું ધૂએ અને ૧ અથવા બે ગ્લાસ પાણી પીવા આપો. બેશુધ્ધ વ્યક્તિને ક્યારેય કંઈપણ મોં વાટે ન આપવું. ડોક્ટરને બોલાવો. સારવાર આપનારા ડૉક્ટરની ઇચ્છા ન હોય ત્યાં સુધી ઊલટી કરાવવા પ્રયાસ ન કરવો.
૨. **જો શ્વાસમાં આવ્યું હોય તો:** દરદીને તાજી હવામાં ખસેડવો અને તેના શરીરના ઉષ્ણતામાનનું ધ્યાન રાખવું. જો દરદી શ્વાસ ન લેતો હોય અથવા શ્વાસોચ્છવાસ મુશ્કેલીપૂર્વક થતો હોય તો, કૃત્રિમ રીતે શ્વાસોચ્છવાસ આપવો. ચિકિત્સકની સલાહ લેવી.
૩. **જો ત્વચાને સ્પર્શું હોય તો :** શરીરના અસરગ્રસ્ત અંગોને, વાળ તથા આંગળીઓના નખની નીચે સહિત, સાબુ અને પુષ્કળ પાણી વડે સાફ કરો. જો પીડા, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે તો, ડૉક્ટરની સલાહ લેવી. બધાં દૂષિત વસ્ત્રો અલગ પાડવાં અને ઉપયોગમાં લેતાં પહેલાં અલગથી સાબુ અને પાણી વડે સારી રીતે ધોવાં.
૪. **જો આંખોમાં પડ્યું હોય તો :** પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી વડે ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ માટે આંખોને હળવાશપૂર્વક ધોવો. જો પીડા, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો, આંખ નિષ્ણાંતની સલાહ લેવી.

ઝેરનું મારણ : કોઈ ચોક્કસ મારણ જાણમાં નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર આપો.

ચેતવણી :

૧. લેબલ/લીફલેટમાં નિર્દિષ્ટ સિવાયના કોઈ પણ હેતુથી ઉપયોગ નહીં કરવો.
૨. આ ઉત્પાદન સિલ્કવોર્મ માટે ઝેરી છે. મલ્બેરીનાંછોડ અને સિલ્કવર્મ ઉછેરની સુવિધાઓ નજીક ધૂમ્ર ઊડવી નહીં જોઈએ. પાન કે માટીમાં છંટકાવમાં સામાન્યરીતે ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ આધારિત રચનાનો ઉપયોગ કરાઈ હોય ત્યાં પાક પછી મલ્બેરીની રોપણીને ફેરવીશો નહીં.
૩. ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ આધારિત રચના મધમાખીઓ સક્રિય હોય ત્યારે છંટકાવ નહીં કરવા જોઈએ.
૪. આ જંતુનાશક સમુદ્રિ જીવો માટે ઝેરી છે અને તેથી મત્સ્યપાલન કરાતું હોય તેની નજીક ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ.

રાસાયણિક સંમિશ્રણ :

ઘટકો	:	% ભાર/ભાર
ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ એ.આઈ.	:	૩૫.૦
સોડિયમ આલ્કાઇલ નેપ્થાલીન સલ્ફોનેટ	:	૦.૫
સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફેનેટ	:	૩.૦
સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ, સલ્ફોમિથાઇલેટેડ	:	૬.૦
એમોરફસ સિલિકા	:	૦.૫
સક્રોઝ	:	૧.૦
માટી	:	૮.૦
લેક્ટોસ મોનોહાઇડ્રિટ	:	પૂરતી માત્રા
કુલ	:	૧૦૦.૦૦

ನಾಟ್‌ಜೆನ್‌ಪ್ರೋ
ಕ್ಲೋರಾಂಥ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 35% ಬ/ಬ ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ
ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಯಗಲ ಕೀಟಕನಾಶನಿ

ಕ್ಲೋರಾಂಥ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 35% ಬ/ಬ ಲೋ ಗಲ ವೆಟ್ಟಬಲ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) ಅನೆದಿ ಅಂಥ್ರಾನಿಲಿಕ್ ಡಯಾಮೈಡ್ ಕೀಟಕನಾಶನಿ. ದೀನ್ನಿ ಬೆಂಡ ಮರಿಯು ಟಮ�್ಯಾಟಾ ಪಂಟಂನು ಸರ್ಯನಾಶಂ ಚೇಸೆ ಗೊಂಗಿಪುರುಗು ಜಾತಿ ಕೀಟಕಾಲನು ಸಮರ್ಥವಂತಂಗಾ ಅರಿಕಟ್ಟುಟಕ್ಕಿ ಸಿಫಾರಸು ಚೇಯಬಡುತುಂದಿ.

ಸಿಫಾರಸುಲು :

ಪಂಟ	ಪೀಡೆದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಂಗಾ ಪಿಲಿವೆ ಪೇರು	ಹೆಕ್ಟಾರುಕು ಮೋತಾದು			ಮಿರಿ ಸ್ಪ್ರೆ ನುಂಡಿ ಕೊಯಲಲೆ ವರಕು ಪೆಂಡಿಪುಂದಾಲ್ಸಿನ ಸಮಯಂ (ರೋಜುಲ್ಲಲ್)	ತಿರಿಗಿ ಪ್ರವೇಶಂ ಪಲಿವೆ ಸಮಯಂ
		ಸ. ಸ. (ಗ್ರಾ.)	ಮಾಲೀಕರಣ (ಎಸ್.ಪಿ.)	ವಾಡಾಲ್ಸಿನ ನೀಟಿ ಮೋತಾದು (ಲಿ.)		
ಬೆಂಡ	ಕಾಯತೊಲಿಯನು ಪುರುಗು (ಹೆಲಿಕೋವೆರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ. ಎರಿಯಾಸ್ ವಿಟ್ಟೆಲ)	25	71	500	5	24
ಟಮೆಟಾ	ಕಾಯತೊಲಿಯನು ಪುರುಗು (ಹೆಲಿಕೊವೆರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ)	30	86	500	3	

ದೀನ್ನಿ ವಾಡುಟಕು ಮಾವನಲು ಮರಿಯು ವಾಡೆ ನಿರ್ಧಾನಮು :

ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ಉಂದಾಲ್ಸಿನ ವಾತಾವರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲು : ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲಲೋ ದೀನ್ನಿ ವಾಡರಾದು.

ವಾಡಂವಲಿನ ಸಮಯಮು, ಪಿಚಿಕಾರಿಲ ಸಂಖ್ಯ, ಗರಿಷ್ಠಂಗಾ ಎನ್ನಿಸಾರ್ಲು ವಾಡಾಲಿ ಮರಿಯು ಪಿಚಿಕಾರಿಲ ಮಧ್ಯ ವ್ಯವಧಿ ಅಲಾಗೆ ಪಂಟ ಏ ದಶಲೋ ದೀನ್ನಿ ವಾಡಾಲಿ : ಈ ಉತ್ಪಾದನ ಆಕುಲಪೈ ಜಲ್ಲುಟಕು ಮಾತ್ರಮೆ ವಾಡಬಡುತುಂದಿ. ಮೊದಟಿ ಪಿಚಿಕಾರಿಯಿ ಪಂಟ ಪೂಲರುಸೈ ದಶಲೋ ಮರಿಯು ಕೀಟಶಾಲ ಜನಾಭಾ ಸಂಖ್ಯ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥ್ರೆಷೋಲ್

நாட்ஜென் ப்ரோ

குளோரான்ட்ரானிலி புரோல் 35% எ/எ டபுள்யூஜி

பரந்த வீரிய செயல்பாடுள்ள பூச்சிக்கொல்லி

குளோரான்ட்ரானிலி புரோல் 3 5 % எ/எ டபுள்யூஜி ஒரு அந்த்ரானிலைக் டையமைட் பூச்சிக்கொல்லி, தக்காளி மற்றும் வெண்டைக்காய் பயிர்களில் காணப்படும் தெதில் இறக்கை இனப் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த இந்த மருந்து சிறப்பாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பரிந்துரை:

பயிர்	பூச்சிகள் பெயர்	ஒரு ஹெக்டேருக்கு அளவு				கடைசி தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)	மருந்து தெளித்த பிறகு நடமாட்டம்
		தி.மு. (கிராம்)	கலவை (கி/ஹா)	கலக்கும் நீர் அளவு (லிட்டர்)	
வெண்டைக் காய்	காய் துளைப்பான் (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிகேரா மற்றும் எரியாஸ் விட்டெல்லா)	25	71	500	5	24
தக்காளி	பழம் துளைப்பான் (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிகேரா)	30	86	500	3	

பயன்படுத்தும் விதம் / தெளிக்கும் வழிமுறை :

வானிலை நிலவரம் (பொதுவாக) : சாதகமில்லாத வானிலையின் போது மருந்து பயன்பாட்டைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

மருந்து தெளிக்கும் காலம், தெளிப்பு எண்ணிக்கை மற்றும் பயிர் வளர்ச்சி அடிப்படையில் அதிகபட்சம் தெளிக்க வேண்டிய தடவை : இந்த மருந்தை இலை தெளிப்பானாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். புக்க ஆர்மிகேரா பருவத்தில் முதல் தெளிப்பு செய்ய வேண்டும், இப் பருவத்தில் பூச்சியின் இடுவல் (பொருளாதார இழப்பு வரம்பு) அளவை எட்டுவதற்கு முன்பாகத் தெளிக்க வேண்டும். இதைத் தொடர்ந்து 12-14 நாட்கள் இடைவெளியில் இரண்டாவது தெளிப்பு செய்ய வேண்டும். ஒரு பயிர் பருவத்தில் 2 தெளிப்புகளுக்கு மிகையாக மருந்தைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

தெளிப்பு கருவிகள் மற்றும் கூம்பு முனை வகை : அதிக கொள்ளளவு கருவிகளான நாப்சாக் ஸ்பிரேயர், ஃபூட் ஸ்பிரேயர் ஆகியவற்றில் வெற்று கூம்பு முனை பொருத்தி ஒரே சீராக தாவரம் முழுவதும் நனையும் வகையில் மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும்.

மருந்து கரைசல் தயாரிக்கும் குறிப்புகள் : டேங்கில் 1/2, 1/4 பாகத்திற்கு தண்ணீரை நிரப்பிக்கொள்ள வேண்டும். வேபிலில் கொடுத்திருக்கும் அளவைப் பின்பற்றி டேங்கில் நேரடியாக மருந்தைச் சேர்க்க வேண்டும். பூச்சிக்கொல்லி மருந்து முழுவதும் கரையும் விதமாக கலரைவை நன்றாகக் கலக்கிக் கொடுக்க வேண்டும். மருந்து கரைசலை இரவு முழுவதும் டேங்கிலேயே வைத்திருக்கக் கூடாது.

நிலம் மற்றும் நீர் : குறிப்பிட்ட நிலம் மற்றும் நீர் பாசன வசதிகள் எதுவும் கிடையாது.

பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள் :

1. மருந்தைக் கையாளும் பொழுது பயன்படுத்தும் போதும் எதையும் சாப்பிட, குடிக்க, அல்லது புகைபிடிக்கக் கூடாது.
2. முழுக்கை சட்டை, முழு கால் பேன்ட், இரசாயனத் தடுப்பி கையுறைகள், முகக் கவசம் மற்றும் கால்களை மூடும் வகுக்கள் ஆகியவற்றை அணிந்து மருந்தைக் கையாள வேண்டும்.
3. காற்றடிக்கும் திசையில் மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும், மருந்து உடல் மீதி தெறிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
4. தெளிப்பான் கூம்பு முனையை வாய் வைத்து ஒருபோதும் ஊதக் கூடாது. அடைபட்டிருக்கும் கூம்பு முனையை மெல்லிய குச்சி அல்லது பிரஷ் பயன்படுத்தி அடைப்பை நீக்க வேண்டும்.
5. மருந்து ஒருவேளை உடல் மீது தெறித்துவிட்டால், நிறைய தண்ணீரில் நன்றாகச் சோப்பு போட்டு சுத்தமாகக் குளிக்க வேண்டும்.
6. சரிவர மூடப்படாத உடல் பகுதிகள் மற்றும் கைகாக்களை நன்றாகச் சுத்தம் செய்து கொண்ட பிறகே சாப்பிடுதல், குடித்தல் அல்லது புகைபிடித்தல் செய்ய வேண்டும். மாசடைந்த ஆடைகளைக் கழற்றி அவற்றைத் தனியாகத் துவைத்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

சேமிப்பு :

1. பூச்சிக்கொல்லிகள் அடங்கிய பேக்கேஜ்களை அதன் தன்மை மற்றும் அளவை பொருத்தது மற்ற பொருட்களை சேமிக்கும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட தனியான அறையில் அல்லது கட்டிடங்களில் அல்லது தனியான அமைமாயில் சேமித்து பூட்டி வைக்கவும்.
2. சேமிப்பு அறைகள் நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்ந்து, நல்ல வெளிச்சம், காற்றோட்டம். ஈரத் தன்மையினால் மாசு ஏற்படுவதை தவிர்க்க போதுமான பரப்பளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

அகற்றுதல் :

1. காலி கொள்கலன்களை மறுபயோகம் செய்வது ஆபத்தானது. காலி கொள்கலன்களை மூன்று முறை அமம்பி சத்தம் செய்து சுத்தம் செய்த நீரை தெளிக்கும் கரைசலுடன் சேர்த்து தெளித்துவிட வேண்டும்.
2. பேக்கேஜ்களை உடைத்து வளிப்பிடிப்களுக்கு அப்பால் புதைக்கவும்.
3. உபயோகித்த பேக்கேஜ்களை மறுமுறை பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியில் விட்டு வைக்கக்கூடாது.
4. பேக்கேஜ்கள் அல்லது எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் கழுவுநீர் முதலியவற்றை சுற்றுப்புற சூழல் அல்லது நீர் நிலைகளுக்கு மாசு ஏற்படாதவாறு பாதுகாப்பான அறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டியது மருந்தின் உற்பத்தியாளர்கள், மற்றும் உபயோகிப்பவர்களின் கடமை ஆகும்.

நச்சுப்பட்ட அறிகுறிகள் : கண்ணீர், உமிழ்நீர் மற்றும் / அல்லது மூக்கிலிருந்து சளி அதிகம் ஒழுகும்.

முதலுதவி :

1. **விழுங்கியிருந்தால் :** நோயாளி சுயநினைவுடன் விழிப்புடன் இருந்தால், வாயைக் கொப்பளிக்கச் செய்து 1அல்லது 2கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கச் செய்யுங்கள். சுயநினைவு தவறியிருப்பவர்களுக்கு வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்கக் கூடாது. மருத்துவமனைக் கூப்பிட வேண்டும். மருத்துவரின் மேற்பார்வை இல்லாமல் நோயாளியை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது.
2. **சுவாசித்திருந்தால் :** நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, உடல் தட்பவெப்பத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். ஒருவேளை நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சுவாசிக்க சிரமப்படுகிறார் என்றால், வாயுடன் வாய் வழியாக ஊதி செயற்கை சுவாசமளிக்க வேண்டும். மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும்.
3. **மருந்து சருமத்தில் பட்டிருந்தால் :** நன்றாகக் குளிக்க வேண்டும். சோப்பு போட்டு நிறைய தண்ணீரி குளிக்க வேண்டும். வீரல் நகங்களின் கீழ் தலை முடி அனைத்தையும் நன்றாகக் சுத்தம் செய்து குளிக்க வேண்டும். வலி, கண்றுதல் அல்லது உறுத்தல் உணர்வுகள் தொடர்ந்திருந்தால், மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற வேண்டும். மாசுபட்ட ஆடைகளை தனியாக நன்றாக சோப்பு போட்டு துவைத்த பிறகே மறுபயோகம் செய்ய வேண்டும்.
4. **கண்களில் பட்டிருந்தால் :** கண்களை நன்றாக அமம்பிக்கொள்ள வேண்டும். தொடர்ந்து 1 5 நிமிடங்கள் வரை கண்களில் தண்ணீரை அடித்து கழுவிக்கொள்ள வேண்டும். வலி, உறுத்தல், கண்றுதல் அல்லது பிரகாசத்தை சகிக்க முடியாத நிலையை இருந்தால், கண் மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற வேண்டும்.

நச்சு முறிவு : குறிப்பிட்ட நச்சு முறிவு எதுவும் கிடையாது. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சைகளுளி க்கவும்.

எச்சரிக்கைகள் :

1. இந்த லேபில் மற்றும் கையேட்டில் குறிப்பிட்டிருக்கும் பயிர்களைத் தவிர்த்து வேறு பயிர்கள் மீது தெளிக்கக் கூடாது.
2. பட்டுப்பூச்சிகளுக்கு இத் தயாரிப்பு நஞ்சாகும். ஆகையால் அருகிலிருக்கும் மல்பெரி தோட்டங்கள் மற்றும் பட்டுப்பூச்சிகள் வளர்ப்பு இடங்களில் மருந்து தெளிப்பு எட்டாவதாறு கவனமாகத் தெளிக்க வேண்டும். குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் அடிப்படையுள்ள தயாரிப்புகளை இலை தெளிப்பு / நிலம் தெளிப்பு மருந்தாக வழக்கமாகப் பயன்படுத்தும் இடங்களில் மல்பெரி தோட்டங்களைச் சுழற்றி முறையில் பயிரிடக் கூடாது.
3. குளோரான்ட்ரானிலிபுரோல் அடிப்படையுள்ள தயாரிப்புகளை தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாகப் பறந்து கொண்டிருக்கும் காலங்களில் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
4. நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு இத் தயாரிப்பு நஞ்சாக இருக்கும் என்பதால், மீன்வளர்ப்பு இடங்களுக்கு அருகில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

இரசாயனச் சேர்க்கை :

மூலப்பொருள்கள்	:	% எ/எ
குளோரான்ட்ரானிலி புரோல் ஏ.ஐ.	:	35.0
சோடியம் அல்கைல் நப்ப்தலின் சல்ஃபோனேட்	:	0.5
சோடியம் லிக்னோசல்ஃபோனேட்	:	3.0
சோடியம் லிக்னோசல்ஃபோனேட், சல்ஃபோமிதைலேடெட்	:	6.0
அமோர்போசில்சிலிகா	:	0.5
சுக்ரோஸ்	:	1.0
கீனே	:	8.0
லாக்டோஸ் மோனோஹைட்ரேட்	:	Q.S.
மொத்தம்	:	100.00

ನಾಟ್‌ಜೆನ್ ಪ್ರೊ

ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 35% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ

ವಿಶಾಲ ರೋಪಿತ ಕೀಟನಾಶಕ

ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 35% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ ಒಂದು ಅಂಥ್ರಾನಿಲಿಕ್ ಡಯಾಮೈಡ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಟೊಮಟೋ ಲೆಪಿಡೊಪ್ಟರಾನ್ ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು :

ಬೆಳೆಗಳು	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಕೊಯಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)	ಮರು ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸುತ್ತಿರಲಾದ ಮಿ.ಲೀ)	ಅವಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ನೀರು (ಲೀ)		
ಬೆಂಡೆ	ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಕ (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ ಮತ್ತು ಎರಿಯಾಸ್ ವಿಟೆಲ್ಲಾ)	25	71	500	5	24
ಟೊಮಟೊ	ಕಾಯಿಕೊರೆಕ (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ)	30	86	500	3	

ಬಳಕೆ/ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು :

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ : ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕದ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ.

ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ಬೆಳೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರ್ತನ : ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಕೀಟಗಳು ಇಟಿಲಲ್ (ಎಕನಮಿಕ್ ಥ್ರೆಶಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟ) ಇರುವಾಗ ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು 12-14 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಯ ಋತುವಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ನಾಜಲ್ ವಿಧ : ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾದ ಕವರೇಜ್ ಗಾಗಿ ನಾಪ್ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಾಯರ್, ಸ್ಟ್ರಟ್ ಸ್ಪಿರಿಯರ್ ಆಕ್ಷಿಯವರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲು ಕೋನ್ ನಾಜಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಾಯರ್ ಸಂತಹ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಣಾ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು : ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ 1/4 ರಿಂದ 1/2 ದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಹರದಲು ಲೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಗಳ ಪ್ರಕಾರಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ನೇರಿರಿ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸಿಂಪಡಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು : ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು :

1. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ವೀಳ್ಯದಲೆ ಅಗಿಯಬೇಡಿ.
2. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬು ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್, ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಯಾಂಟ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿರೋಧಕ ಗ್ಲೋವ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಮಂಡಿಯವರೆಗೂ ಮುಚ್ಚುವ ಕೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
3. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನ ವಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ತುಂತುರು ನಿಮ್ಮಹಾಗೂ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
4. ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಾಜಲ್ ಅನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಊದಬೇಡಿ. ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಾಜಲ್ ಅನ್ನು ತಳುವಾದ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಶ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
5. ಸಿಂಪಡಣೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ದೇಹದ ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾಬುನಾಸ ಸುತ್ತು ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
6. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆತಮಗಿ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಂರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಲುಶಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಶೇಖರಣೆ :

1. ಕೀಟನಾಶಕಕ್ಕಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನುಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿರಿ.
2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಕೀಲಿಯಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಳಗೆ ನೆಗ್ಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿ ಕುಮ್ಮ ಮಾತ್ರವರಿಯವು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು. ಹವೆಯಿಂದಾಗುವ ಮಾರ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ವಿಲೇವಾರಿ :

1. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕೀಟನಾಶಕದ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಲಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಲಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಣಾ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಪ್ಯಾಕೆಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಣಿಯಬೇಕು.
3. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಜುಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗ ತಡಗಟ್ಟಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು.
4. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಜುಗಳು, ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು, ತಯಾರಕರು, ಸಂತ್ರಿಕರಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಬಳಸುವವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಿಷಕಾರಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಕಣ್ಣುಗಳು, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

1. **ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ :** ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಬಳಿಕ 1 ಅಥವಾ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆತರಿರಿ, ವಾಕರ್ತರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಡಿ.
2. **ಉಸಿರಿನಮೂಲಕ ಒಳಹೋದಲ್ಲಿ :** ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ, ದೇಹದ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ನಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
3. **ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲಿದಲ್ಲಿ :** ದೆಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೆರಳಿನಿಂದ ಬಳಿಸಿ ಸಾದ್ರವತಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಹಾಗುರುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ, ನೋವು, ಕಿರಿಚಾಗುವಿಕೆ ಉರಿ ಮಾಯಮಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಮನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗದುಕೊಳ್ಳಿ.
4. **ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಂಪಕರವಾಗದಲ್ಲಿ :** ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೋವು, ಕೆಂಗಣ್ಣು, ಉರಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ನೋಡಲು ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೇಷಧ : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಷಧ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ :

1. ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿರುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಯಾವದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು.
2. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ರೇಷ್ಮೆಹುಳುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟನಾಶಕದ ತುಂತುರು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಆಧಾರಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಎಲೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಸಸಿ ನಡುವುದನ್ನು ಮರವರ್ತಿಸಬೇಡಿ.
3. ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್-ಆಧಾರಿತ ಸಂತ್ರಿಕರಣಗಳನ್ನು ಜೇನುಹುಳುಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ-ರುವಾಗ ಬಳಸಬಾರದು.
4. ಈ ಕೀಟನಾಶಕವು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೀನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಅಂಶಗಳು	:	% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಎ.ಐ.	:	35.0
ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಿಲ್ ನಾಫ್ಥಾಲೀನ್ ಸಲ್ಫೂನೇಟ್	:	0.5
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೇಟ್	:	3.0
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೇಟ್, ಸಲ್ಫೂಮಿಥೈಲೇಟೆಡ್	:	6.0
ಅಮೊರ್ಫಸ್ಸೂಸ್ ಸಿಲಿಕಾ	:	0.5
ಸುಕ್ರೋಸ್	:	1.0
ಕೌಲಿ	:	8.0
ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮೊನೊಹೈಡ್ರೆಟ್	:	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್
ಒಟ್ಟು	:	100.00

ناٹ‌جین پرو

کلورانٹرانلی پرول 35% ای/ای ڈبلیو جی

وسیع اسپکٹرم کیڑے مار دوا

کلورانٹرانلی پرول 35% ای/ای ڈبلیو جی ایک اینتھرانیلک ڈائیمائیڈ کیڑے مار دوا ہے، جو بھنڈی اور ٹماٹر کے پتے کھانے والے کیڑوں کے خلاف تجویز کی جاتی ہے۔

سفارشات :

فصل	کیڑے کا عام نام	ہیکٹر کی شرح			کٹائی اور ذبیحہ کے درمیان انتظار کا دن	دوبارہ داخلہ کا وقت
		ف.ج. (گرام)	فارمولیشن (ملی لیٹر)	پانی کی مقدار (لیٹر)		
بھنڈی	پھل بیدھنے والا (ہیلیکوورپا آرمیگیرا اور ہیلیکوورپا زیا)	۲۵	۷۱	۵۰۰	۵	۲۴
ٹماٹر	پھل بیدھنے والا (ہیلیکوورپا آرمیگیرا اور ہیلیکوورپا زیا)	۳۰	۸۶	۵۰۰	۳	

استعمال کا طریقہ اور اسپرے کا طریقہ :

موسمی حالات : موسم کی خراب حالت کے دوران سفارش نہیں کی جاتی۔

زیادہ سے زیادہ اسپرے اور فصل کی نشوونما کے مرحلے : یہ پروڈکٹ پتوں پر اسپرے کے لیے ہے۔ پہلا اسپرے کیڑے کی آمد کے شروع ہونے پر کیا جانا چاہیے۔ دوسرا اسپرے 12-14 دن کے وقفے سے کیا جانا چاہیے۔ ایک فصل کے موسم میں 2 اسپرے سے زیادہ نہیں کرنے چاہئیں۔

اسپرے کے آلات اور نوزل کی قسم : اچھی اور یکساں کوریج کے لیے نیپسیک ا